

[Прокто-Гливенол \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [C05AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лидокаин](#)
- [Трибенозид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суппозитории ректальные** твердые, торпедообразной формы, без трещин, слегка жирные на ощупь, желтовато-белого цвета, со слабым специфическим запахом.

	1 супп.
трибенозид	400 мг
лидокаин	40 мг

Вспомогательные вещества: витепсол Е85 (суппозиторная масса №1) - 305 мг, витепсол W35 (суппозиторная масса №2) - 1255 мг.

5 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Прокто-Гливенол (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Фармакодинамика

Комбинированный противогеморроидальный препарат.

Трибенозид уменьшает проницаемость капилляров и улучшает сосудистый тонус, антагонистически воздействует на некоторые эндогенные вещества, выполняющие роль медиаторов при развитии воспаления и боли.

Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие.

Препарат вызывает быстрое ослабление симптомов, вызванных геморроем (боль, зуд и натяжение кожи).

Фармакокинетика

Всасывание

Системная биодоступность трибенозида при ректальном введении составляет 30% биодоступности при приеме внутрь (в форме капсул). После ректального введения одного суппозитория (400 мг) C_{\max} трибенозида в плазме крови достигается через 2 ч и составляет 1 мкг/мл (трибенозид+метаболиты).

Метаболизм

Трибенозид и лидокаин быстро метаболизируются в печени.

Выведение

20-27% дозы выводится с мочой в виде метаболитов.

Показания к применению:

— наружный и внутренний геморрой.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)

Противопоказания:

- печеночная недостаточность;
- I триместр беременности;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают ректально по 1 супп. утром и вечером до исчезновения выраженных клинических симптомов. При *регрессии острых симптомов* - по 1 супп. 1 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны иммунной системы: очень редко (< 1/10 000) - анафилактические реакции, включая ангионевротический отек, отек лица, бронхоспазм и сердечно-сосудистые нарушения.

Со стороны кожи и подкожных тканей: редко (>1/10 000, < 1/1 000) - кожные реакции в месте применения (жжение, сыпь, зуд и крапивница). Данные симптомы могут распространяться за пределы места применения.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы.

При случайном приеме внутрь рекомендуется промывание ЖКТ, а также симптоматическая поддерживающая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности Прокто-Гливенол не назначают в I триместре. При применении препарата во II и III триместрах беременности необходимо учитывать возможный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует взвесить ожидаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия не зарегистрированы.

Особые указания и меры предосторожности:

Если на фоне применения препарата состояние пациента не улучшается или появляются необычные симптомы, следует верифицировать диагноз.

В период лечения пациент должен следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении в дозах, не превышающих рекомендуемые, препарат не оказывает влияния на способность выполнения работы, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prokto-Glivenol_svechi