# Прокто-Гливенол (свечи)




## Код АТХ:

- C05AX03

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин
- Трибенозид

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные*** твердые, торпедообразной формы, без трещин, слегка жирные на ощупь, желтовато-белого цвета, со слабым специфическим запахом.

| | **1 супп.** |
|---|---|
| трибенозид | 400 мг |
| лидокаин | 40 мг |

*Вспомогательные вещества:* витепсол E85 (суппозиторная масса n°1) - 305 мг, витепсол W35 (суппозиторная масса n°2) - 1255 мг.

5 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный противогеморроидальный препарат.

*Трибенозид* уменьшает проницаемость капилляров и улучшает сосудистый тонус, антагонистически воздействует на некоторые эндогенные вещества, выполняющие роль медиаторов при развитии воспаления и боли.

*Лидокаин* оказывает местноанестезирующее действие.

Препарат вызывает быстрое ослабление симптомов, вызванных геморроем (боль, зуд и натяжение кожи).

***Фармакокинетика***

*Всасывание*

Системная биодоступность трибенозида при ректальном введении составляет 30% биодоступности при приеме внутрь (в форме капсул). После ректального введения одного суппозитория (400 мг) $C_{max}$ трибенозида в плазме крови достигается через 2 ч и составляет 1 мкг/мл (трибенозид+метаболиты).

*Метаболизм*

Трибенозид и лидокаин быстро метаболизируются в печени.

*Выведение*

20-27% дозы выводится с мочой в виде метаболитов.

## Показания к применению:

— наружный и внутренний геморрой.

## Относится к болезням:

- Геморрой

## Противопоказания:

— печеночная недостаточность;

— I триместр беременности;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают ректально по 1 супп. утром и вечером до исчезновения выраженных клинических симптомов. При *регрессии острых симптомов* - по 1 супп. 1 раза/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны иммунной системы:* очень редко (< 1/10 000) - анафилактические реакции, включая ангионевротический отек, отек лица, бронхоспазм и сердечно-сосудистые нарушения.

*Со стороны кожи и подкожных тканей:* редко (>1/10 000, < 1/1 000) - кожные реакции в месте применения (жжение, сыпь, зуд и крапивница). Данные симптомы могут распространяться за пределы места применения.

## Передозировка:

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы.

При случайном приеме внутрь рекомендуется промывание ЖКТ, а также симптоматическая поддерживающая терапия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности Прокто-Гливенол не назначают в I триместре. При применении препарата во II и III триместрах беременности необходимо учитывать возможный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует взвесить ожидаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для ребенка.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия не зарегистрированы.

## Особые указания и меры предосторожности:

Если на фоне применения препарата состояние пациента не улучшается или появляются необычные симптомы, следует верифицировать диагноз.

В период лечения пациент должен следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При применении в дозах, не превышающих рекомендуемые, препарат не оказывает влияния на способность выполнения работы, связанной с необходимостью концентрации внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при печеночной недостаточности.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Prokto-Glivenol_svechi