

## [Проктофитол \(Противогеморроидальный сбор\)](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Кориандра плоды](#)
- [Крушины ольховидной кора](#)
- [Сенны остролистной листья](#)
- [Солодки корни](#)
- [Тысячелистника обыкновенного трава](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированное средство растительного происхождения. Оказывает слабительное, вяжущее, спазмолитическое, противовоспалительное и гемостатическое действие.

### **Показания к применению:**

- регулирование стула у пациентов с геморроем;
- атонические запоры.

### **Относится к болезням:**

- [Геморрой](#)
- [Запор](#)

### **Противопоказания:**

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения);
- беременность;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Принимать внутрь, в виде настоя.

Измельченное сырье: 5-6 г (1 ст. ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Фильтр-пакеты: 2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают в течение 15 мин, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Полученный настой принимают по 1/2-1 стакану на ночь. Длительность лечения определяется характером заболевания, достигнутым эффектом и сопутствующей терапией. Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

## **Побочное действие:**

Аллергические реакции. При длительном применении возможны запор, жажда, снижение массы тела, головная боль, кардиалгия, гипокалиемия

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Готовый отвар можно хранить в прохладном месте не более 48 ч.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Proktofitol\\_Protivogemorroidalnyy\\_sbor](http://drugs.thead.ru/Proktofitol_Protivogemorroidalnyy_sbor)