Проктоседил

Код АТХ:

- C05AX03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бензокаин
- Бутамбен
- Гидрокортизон
- Фрамицетин
- Эскулозид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для местного применения*** в виде массы почти белого цвета с зеленовато-желтоватым оттенком.

	1 г
гидрокортизона ацетат	5.58 мг
фрамицетина сульфат	10 мг
гепарин натрия	100 МЕ
эскулозид	10 мг
бензокаин (этиламинобензоат)	10 мг
бутамбен (бутиламинобензоат)	10 мг

Вспомогательные вещества: холестерол, парафин жидкий, парафин мягкий белый, полисорбат 80, пропиленгликоль, макрогол (полиэтиленгликоль) 400, макрогол (полиэтиленгликоль) 4000, макрогол (полиэтиленгликоль) 1540.

10 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с пластиковой насадкой (канюля-дозатор) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения геморроя и других заболеваний аноректальной зоны.

Гидрокортизон – глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительное действие. Устраняет признаки и

симптомы воспаления, такие как краснота, отечность, боль и другие.

Фрамицетина сульфат – антибиотик широкого спектра действия для местного применения из группы аминогликозидов. Фрамицетин продуцируется некоторыми видами стрептомицетов и впервые был выделен из Streptomyces lavendulae. В экспериментах in vitro показано, что фрамицетин, как и другие аминогликозиды, влияет на белковый синтез путем специфического и необратимого ингибирования 30S субъединиц рибосом бактерий, приводящего к ошибке считывания мРНК, благодаря чему фрамицетин обладает бактерицидной активностью в отношении ряда грамотрицательных микроорганизмов (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aerobacter spp., Salmonella typhimurium, Salmonella paratyphi B, Shigella spp., Pasteurella multocida, Brucella spp., Proteus spp. (в т.ч. Proteus vulgaris), Pseudomonas spp. (в т.ч. Pseudomonas aeruginosa), Serratia marcescens, Alcaligenes spp. и Bacillus subtilis), а также грамположительных кокков (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae), причем стрептококки менее чувствительны к фрамицетину. Фрамицетин не действует на патогенные грибы, вирусы, анаэробную флору. В клинических исследованиях показано медленное развитие устойчивости микроорганизмов к фрамицетина сульфату.

Гепарин натрия (натриевая соль гепарина) является антикоагулянтом. Предотвращает тромботические осложнения геморроя.

Эскулозид - вещество, сходное по своей химической структуре с рутозидом; уменьшает повышенную ломкость капилляров.

Бензокаин и бутамбен обладают местноанестезирующим и противозудным действием, уменьшают спазм анального сфинктера.

Эффект препарата проявляется через несколько минут после применения.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

— внутренний и наружный геморрой (острый и хронический);

— профилактика рецидивов внутреннего и наружного геморроя;

— перианальная экзема;

— проктит;

— острые и хронические трещины заднего прохода;

— предоперационное и послеоперационное лечение больных с геморроем;

— послеродовый геморрой.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Проктит
- Экзема

Противопоказания:

— туберкулезное, вирусное, грибковое поражение аноректальной зоны;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский возраст (в связи с отсутствием клинических данных по применению препарата).

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

С *осторожностью* следует применять препарат у пациентов с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью.

Способ применения и дозы:

Наружно. Небольшое количество мази следует наносить пальцем на участки локализации зуда или боли утром и вечером, а также после каждой дефекации.

Для более глубокого введения в прямую кишку следует надеть аппликатор на тюбик с мазью, ввести его в прямую кишку, убедиться в том, что он введен достаточно глубоко в прямую кишку, и затем, осторожно нажимая на тюбик с нижнего конца, вводить мазь в прямую кишку, постепенно вынимая аппликатор.

Мазь можно применять отдельно или в сочетании с ректальными капсулами Проктоседил М.

Проктоседил применяется в течение короткого времени (не более 7 дней).

Побочное действие:

Местные реакции: чувство дискомфорта в области прямой кишки, жжение в прямой кишке, сухость слизистой оболочки прямой кишки.

Прочие: присоединение вторичной инфекции, аллергические реакции и другие реакции повышенной чувствительности.

При применении препарата в высоких дозах и в течение длительного времени существует риск возникновения системных побочных эффектов, связанных с наличием в составе препарата гидрокортизона.

Передозировка:

Данные о передозировке не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Проктоседил не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат после истечения срока годности.

Применение в детском возрасте

Противопоказано применение препарата в детском возрасте (в связи с отсутствием клинических данных).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности **-** 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Proktosedil