

[Проктоседил М](#)



Код АТХ:

- [C05AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензокаин](#)
- [Бутамбен](#)
- [Гидрокортизон](#)
- [Фрамицетин](#)
- [Эскулозид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [Википедия](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#) [англ](#)

Форма выпуска:

♦ **Капсулы ректальные** мягкие желатиновые, грушевидной формы, светло-желтого цвета; содержимое капсул - жирная масса желтовато-белого цвета.

	1 капс.
фрамицетина сульфат	5 мг
гидрокортизона ацетат	2.79 мг
эскулозид	5 мг
бензокаин (этиламинобензоат)	5 мг
бутамбен (бутиламинобензоат)	5 мг

Вспомогательные вещества: ланолин, парафин мягкий белый, парафин жидкий.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол (глицерин), метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), титана диоксид (E171), вода очищенная.

20 шт. - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения геморроя.

Гидрокортизон - глюкокортикостероид, является противовоспалительным средством. Устраняет различные признаки и симптомы воспаления, такие как краснота, отечность, боль.

Фрамицетина сульфат - антибиотик широкого спектра действия для местного применения. Обладает бактерицидной активностью в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Эскулозид - вещество, сходное по своей химической структуре с витамином Р, уменьшает повышенную ломкость капилляров.

Этиламинобензоат и бутиламинобензоат обладают местным обезболивающим и противозудным действием, уменьшают спазм анального сфинктера.

Эффект препарата проявляется через несколько минут после применения.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

— внутренний геморрой.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)

Противопоказания:

- туберкулезное, вирусное, грибковое поражения аноректальной зоны;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- грудной возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат у пациентов с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью.

Способ применения и дозы:

Наружно. Проктоседил М следует применять утром и вечером, а также после каждой дефекации.

Ректальную капсулу следует ввести как можно глубже в прямую кишку. После улучшения состояния количество ректальных капсул можно сократить до 1 капсул./сут.

Проктоседил М ректальные капсулы можно комбинировать с мазью Проктоседил.

Препарат применяется в течение короткого времени (не более 7 дней).

Побочное действие:

Местные реакции: чувство дискомфорта в области прямой кишки, жжение в прямой кишке, сухость слизистой оболочки прямой кишки.

Прочие: присоединение вторичной инфекции, аллергические реакции.

При применении ректальных капсул Проктоседил М в высоких дозах и/или в течение длительного времени существует риск возникновения системных побочных эффектов, связанных с гидрокортизоном.

Передозировка:

Данные о передозировке не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат после истечения срока годности.

Применение в детском возрасте

Противопоказано применение препарата в грудном возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8°C до 25°C. Срок годности - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Proktosedil_M