Проктозан



Код АТХ:

- C05AX02

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для ректального и наружного применения***	**1 г**
буфексамак	50 мг
висмута субгаллат	50 мг
титана диоксид	50 мг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	5 мг

Вспомогательные вещества: воск шерстяной, парафин жидкий легкий, поликос (20% полиэтилена + 80% парафина жидкого легкого), изопропила пальмитат, сорбитана сесквиолеат, сорбитол, вода.

20 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

◊ ***Суппозитории ректальные***	**1 супп.**
буфексамак	250 мг
висмута субгаллат	100 мг
титана диоксид	100 мг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

Вспомогательные вещества: жир твердый.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для местного лечения заболеваний аноректальной области.

Буфексамак - производное арилуксусной кислоты. Оказывает противовоспалительное действие, обусловленное ингибированием синтеза простагландинов.

Висмута субгаллат и титана диоксид - оказывают вяжущее и подсушивающее действие, способствуют заживлению ран.

Лидокаин - местный анестетик амидного типа.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Проктозан не предоставлены.

Показания к применению:

— геморрой 1 и 2 степени;

— трещины заднего прохода;

— острая и хроническая анальная экзема;

— воспалительные процессы в области прямой кишки (в т.ч. проктит).

Относится к болезням:

- Экзема

Противопоказания:

— специфические воспалительные процессы (в т.ч. сифилис, туберкулез);

— детский возраст;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При наружном применении мазь наносится на пораженный участок заднего прохода 2 раза/сут. Перед применением кожу следует вымыть теплой водой и мягкой салфеткой (без мыла).

При ректальном применении мазь при помощи прилагаемого аппликатора вводится в прямую кишку 1-2 раза/сут (по возможности после опорожнения кишечника).

Ректальные суппозитории применяют по 1 суп. 1-2 раза/сут (по возможности после опорожнения кишечника).

Рекомендуется продолжение применения препарата в течение 8-10 дней после стихания острых явлений.

Побочное действие:

Аллергические реакции: жжение, зуд, покраснение кожи перианальной зоны, отек, образование чешуек, пузырьков.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Проктозан не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Проктозан противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Проктозан не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При одновременном применении Проктозана и презервативов возможно уменьшение прочности презервативов, что снижает их надежность.

Следует предупредить пациента о том, что при отсутствии эффекта или появлении каких-либо побочных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Proktozan