

## [Проктозан \(свечи\)](#)



### Код АТХ:

- [C05AX02](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|  |            |
|--|------------|
| <b>Мазь для ректального и наружного применения</b> | <b>1 г</b> |
| буфексамак   | 50 мг      |
| висмута субгаллат                                  | 50 мг      |
| титана диоксид                                     | 50 мг      |
| лидокаина гидрохлорида моногидрат                  | 5 мг       |

*Вспомогательные вещества:* воск шерстяной, парафин жидкий легкий, поликос (20% полиэтилена + 80% парафина жидкого легкого), изопропила пальмитат, сорбитана сесквиолеат, сорбитол, вода.

20 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Суппозитории ректальные</b>    | <b>1 супп.</b> |
| буфексамак                        | 250 мг         |
| висмута субгаллат                 | 100 мг         |
| титана диоксид                    | 100 мг         |
| лидокаина гидрохлорида моногидрат | 10 мг          |

*Вспомогательные вещества:* жир твердый.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

## Проктозан (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат для местного лечения заболеваний аноректальной области.

Буфексмак - производное арилуксусной кислоты. Оказывает противовоспалительное действие, обусловленное ингибированием синтеза простагландинов.

Висмута субгаллат и титана диоксид - оказывают вяжущее и подсушивающее действие, способствуют заживлению ран.

Лидокаин - местный анестетик амидного типа.

### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Проктозан не предоставлены.

### **Показания к применению:**

- геморрой 1 и 2 степени;
- трещины заднего прохода;
- острая и хроническая анальная экзема;
- воспалительные процессы в области прямой кишки (в т.ч. проктит).

### **Относится к болезням:**

- [Экзема](#)

### **Противопоказания:**

- специфические воспалительные процессы (в т.ч. сифилис, туберкулез);
- детский возраст;
- беременность;
- период лактации (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

При наружном применении мазь наносится на пораженный участок заднего прохода 2 раза/сут. Перед применением кожу следует вымыть теплой водой и мягкой салфеткой (без мыла).

При ректальном применении мазь при помощи прилагаемого аппликатора вводится в прямую кишку 1-2 раза/сут (по возможности после опорожнения кишечника).

Ректальные суппозитории применяют по 1 суп. 1-2 раза/сут (по возможности после опорожнения кишечника).

Рекомендуется продолжение применения препарата в течение 8-10 дней после стихания острых явлений.

### **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* жжение, зуд, покраснение кожи перианальной зоны, отек, образование чешуек, пузырьков.

### **Передозировка:**

Данные о передозировке препарата Проктозан не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат Проктозан противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Проктозан не предоставлены.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При одновременном применении Проктозана и презервативов возможно уменьшение прочности презервативов, что снижает их надежность.

Следует предупредить пациента о том, что при отсутствии эффекта или появлении каких-либо побочных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Proktozan\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Proktozan_svechi)