# Проктозан (свечи)




## Код АТХ:

- C05AX02

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ◊ ***Мазь для ректального и наружного применения*** | **1 г** |
|---|---|
| буфексамак | 50 мг |
| висмута субгаллат | 50 мг |
| титана диоксид | 50 мг |
| лидокаина гидрохлорида моногидрат | 5 мг |

*Вспомогательные вещества:* воск шерстяной, парафин жидкий легкий, поликос (20% полиэтилена + 80% парафина жидкого легкого), изопропила пальмитат, сорбитана сесквиолеат, сорбитол, вода.

20 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

| ◊ ***Суппозитории ректальные*** | **1 супп.** |
|---|---|
| буфексамак | 250 мг |
| висмута субгаллат | 100 мг |
| титана диоксид | 100 мг |
| лидокаина гидрохлорида моногидрат | 10 мг |

*Вспомогательные вещества:* жир твердый.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат для местного лечения заболеваний аноректальной области.

Буфексамак - производное арилуксусной кислоты. Оказывает противовоспалительное действие, обусловленное ингибированием синтеза простагландинов.

Висмута субгаллат и титана диоксид - оказывают вяжущее и подсушивающее действие, способствуют заживлению ран.

Лидокаин - местный анестетик амидного типа.

***Фармакокинетика***

Данные о фармакокинетике препарата Проктозан не предоставлены.

## Показания к применению:

— геморрой 1 и 2 степени;

— трещины заднего прохода;

— острая и хроническая анальная экзема;

— воспалительные процессы в области прямой кишки (в т.ч. проктит).

## Относится к болезням:

- Экзема

## Противопоказания:

— специфические воспалительные процессы (в т.ч. сифилис, туберкулез);

— детский возраст;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

При наружном применении мазь наносится на пораженный участок заднего прохода 2 раза/сут. Перед применением кожу следует вымыть теплой водой и мягкой салфеткой (без мыла).

При ректальном применении мазь при помощи прилагаемого аппликатора вводится в прямую кишку 1-2 раза/сут (по возможности после опорожнения кишечника).

Ректальные суппозитории применяют по 1 суп. 1-2 раза/сут (по возможности после опорожнения кишечника).

Рекомендуется продолжение применения препарата в течение 8-10 дней после стихания острых явлений.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* жжение, зуд, покраснение кожи перианальной зоны, отек, образование чешуек, пузырьков.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Проктозан не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Проктозан противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Проктозан не предоставлены.

## Особые указания и меры предосторожности:

При одновременном применении Проктозана и презервативов возможно уменьшение прочности презервативов, что снижает их надежность.

Следует предупредить пациента о том, что при отсутствии эффекта или появлении каких-либо побочных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Proktozan_svechi