

[Пронокогнил](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе видны два слоя: ядро белого или белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета и пленочная оболочка.

	1 таб.
пирибедил	50 мг

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат - 239.8 мг, гипромеллоза - 126 мг, кремния диоксид коллоидный - 2.1 мг, магния стеарат - 2.1 мг.

Состав оболочки таблетки: гипромеллоза - 6.6 мг, макрогол-4000 - 1.8 мг, титана диоксид - 3.6 мг.

- 5 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки контурные ячейковые (4) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки контурные ячейковые (5) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (4) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (5) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные.
- 25 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 25 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
- 25 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
- 25 шт. - упаковки контурные ячейковые (4) - пачки картонные.
- 25 шт. - упаковки контурные ячейковые (5) - пачки картонные.
- 25 шт. - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные.
- 30 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 30 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
- 30 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
- 30 шт. - упаковки контурные ячейковые (4) - пачки картонные.
- 30 шт. - упаковки контурные ячейковые (5) - пачки картонные.
- 30 шт. - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные.
- 10 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
- 20 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
- 30 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
- 40 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
- 50 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.

100 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противопаркинсоническое средство. Механизм действия связан со стимуляцией допаминовых рецепторов преимущественно в ядрах экстрапирамидной системы. Увеличивает кровоснабжение тканей и стимулирует передачу нервных импульсов, что способствует улучшению мозгового метаболизма.

Оказывает вазодилатирующее действие, обусловленное влиянием на допаминовые рецепторы, расположенные в гладкой мускулатуре периферических сосудов.

Фармакокинетика

После приема внутрь пирибедил быстро абсорбируется из ЖКТ, C_{max} достигается через 1 ч. Связывание с белками плазмы низкое. Характеризуется высокой степенью метаболизма с образованием 2 основных метаболитов - гидроксильированного и дегидроксильированного. Концентрация пирибедила в плазме крови снижается двухфазно - $T_{1/2}$ от 1.7 ч до 6.9 ч. Выводится главным образом в виде метаболитов с мочой: почками - 68%, с желчью - 25%.

Показания к применению:

Болезнь Паркинсона (как в виде монотерапии, так и в комбинации с леводопой), хронические нарушения когнитивной функции и нейросенсорный дефицит (в т.ч. расстройства внимания и памяти) при старческой деменции (в качестве дополнительной симптоматической терапии), перемежающаяся хромота вследствие облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей (в качестве дополнительной терапии), ишемические нарушения кровообращения глаза.

Относится к болезням:

- [Деменция](#)

Противопоказания:

Острый инфаркт миокарда, острая сосудистая недостаточность, повышенная чувствительность к пирибедилу.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь суточная доза составляет 50-250 мг. Частота и длительность применения зависят от показаний, реакции пациента на лечение, компонентов комбинированной терапии.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, метеоризм.

Со стороны ЦНС: редко - беспокойство, возбуждение.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: в отдельных случаях - ортостатическая гипотензия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и хорошо контролируемых исследований безопасности применения пирибедила при беременности не проводилось.

В экспериментальных исследованиях не установлено тератогенного действия пирибедила.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Бессонница
- Болезнь Альцгеймера
- Боли в спине
- Вертебро-базилярная недостаточность

Особые указания и меры предосторожности:

При применении у пациентов с артериальной гипертензией необходимо одновременное проведение антигипертензивной терапии.

Не следует применять одновременно с антагонистами допаминовых рецепторов.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Pronokognil>