

[Процицил](#)



Код АТХ:

- [H03BA02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пропилтиоурацил](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает выраженным тиреостатическим эффектом. Препятствует процессу йодирования тиреоглобулина, снижает образование активной формы йода в щитовидной железе, блокируя систему пероксидаз. Тормозит превращение T_4 в T_3 путем образования реверсивного T_3 .

Показания к применению:

Диффузный и смешанный токсический зоб, аутоиммунный тиреоидит с гипертиреозом, предоперационная подготовка к лечению токсического зоба и послеоперационная терапия, подготовка к лечению токсического зоба радиоактивным йодом.

Относится к болезням:

- [Зоб](#)

Противопоказания:

Абсолютные: гипотиреоз, лейкопения, агранулоцитоз, активный гепатит, цирроз печени, беременность, лактация, повышенная чувствительность к пропилтиоурацилу.

Относительные: персистирующий гепатит, жировая дистрофия печени, узловой зоб.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально в зависимости от тяжести гипертиреоза. Средняя разовая доза составляет 100-300 мг; кратность приема - 3-6 раз/сут, после еды. Средняя суточная доза для детей от 6 до 10 лет - 50-150 мг/сут, старше 10 лет - 150-300 мг/сут. Продолжительность терапии составляет 1-1.5 года.

Побочное действие:

Возможно: зуд, парестезии, алопеция, анорексия, тошнота, рвота.

Редко: гипертермия, периартериит.

Очень редко: агранулоцитоз, панцитопения, зобогенный эффект, гипотиреоз.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять пропилтиоурацил одновременно с препаратами, угнетающими лейкопоэз.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение проводят под контролем уровня гормонов щитовидной железы, морфологической картины крови, уровня активности печеночных трансаминаз, концентрации билирубина, ЩФ.

При нарушениях функции печени

Абсолютные противопоказания: активный гепатит, цирроз печени.

Относительные противопоказания: персистирующий гепатит, жировая дистрофия печени.

Применение в детском возрасте

Применение возможно у детей старше 6 лет согласно режиму дозирования.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Propicil>