

## [Прополиса настойка](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Прополис](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ <b>Настойка</b>	<b>100 мл</b>
прополис	10 г

*Вспомогательные вещества:* этанол 80%.

25 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

### **Показания к применению:**

Микротравмы, поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых оболочек, отит, фарингит, тонзиллит, гайморит, заболевания пародонта.

### **Относится к болезням:**

- [Гайморит](#)
- [Пародонтит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

## **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства, поллинозы, острая экзема, возраст до 18 лет.

## **Способ применения и дозы:**

Наружно, местно, ингаляционно. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (микротравмами) обрабатывают тампоном, смоченным настойкой прополиса, 1-3 раза в день. При хронических гнойных отитах после тщательной очистки от гноя в ухо вводят тампон, пропитанный настойкой прополиса, на 1-2 мин 2-3 раза в день или по 1-2 капли в ухо 3-4 раза в день.

При хроническом фарингите и тонзиллите настойкой прополиса смазывают миндалины 1-2 раза в день в течение 8-15 дней. Кроме того, при хроническом тонзиллите водный раствор настойки прополиса в соотношении 1:20 используют для ингаляций. Курс лечения 1-2 ингаляции в день в течение 7-10 дней.

При заболеваниях пародонта настойку прополиса вводят на турундах в пародонтальные карманы на 5 минут после глубокого кюретажа.

При повреждениях слизистой оболочки полости рта водный раствор настойки прополиса (15 мл настойки на 1/2 стакана теплой воды) применяют для полосканий 4-5 раз в день в течение 3-4 дней.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции (зуд, покраснение кожи, сыпь), кратковременное ощущение жжения в месте нанесения препарата. При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **Передозировка:**

До настоящего времени сведения о передозировке препарата не зарегистрированы.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Сведения о влиянии препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора), отсутствуют.

### **Применение в детском возрасте**

Не рекомендуется использовать у детей до 18 лет.

## **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

*Срок годности.* 3 года. Не применять по истечении срока годности.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

## **Прополиса настойка**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Propolisa\\_nastoyka](http://drugs.thead.ru/Propolisa_nastoyka)