Пропротен-100



Код АТХ:

- N07BB

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Антитела к мозгоспецифическому белку S-100

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания***	**1 таб.**
аффинно очищенные антитела к мозгоспецифическому белку S-100	3 мг

20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Разные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат модифицирует функциональную активность белка S-100, осуществляющего в мозге сопряжение информационных и метаболических процессов. Сенситизирует нейрональную мембрану, модулирует синаптическую пластичность нейронов. Оказывает модифицирующее действие на функциональное состояние структур мозга, участвующих в формировании алкогольной зависимости; гипоталамуса, гиппокампа и др.

При алкогольной зависимости оказывает нормализующее влияние на систему позитивного эмоционального подкрепления, что приводит к снижению частоты самостимуляции латерального гипоталамуса. Снижает пачечную активность нейронов гиппокампа; уменьшает количество циркулирующих иммунокомплексов вприферической крови, что коррелирует со снижением потребления этанола. Способствует усилению тормозных влияний ГАБК в ЦНС. Экспериментально установлено, что препарат восстанавливает нейромедиаторньй баланс и условно-рефлекторную деятельность. Повышает устойчивость мозга к гипоксии и к токсическим воздействиям.

Препарат облегчает как психопатологические нарушения (беспокойство, психическое напряжение, бессонница, раздражительность, тревога, снижение настроения, интенсивное влечение к спиртному), так и соматовегетативные расстройства (слабость, потливость, головная боль, тремор, тахикардия, нарушения пищеварения) алкогольного "похмельного" синдрома.

Проявляет противоалкогольное действие, уменьшая влечение к алкоголю и снижая вероятность рецидивов.

Показания к применению:

— монотерапия алкогольного абстинентного синдрома легкой и средней степени тяжести.

Противопоказания:

— беременность;

— период лактации;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают по 1 таб. за 15-20 мин до еды. Таблетку следует держать во рту до полного растворения.

В *состоянии похмелья* первые 2 ч препарат принимают по 1 таб. каждые 30 мин; последующие 8-10 ч - по 1 таб. в час. В случае наступления сна прием возобновляют после пробуждения.

В дальнейшем при улучшении состояния препарат принимают по 1 таб. каждые 2-3 ч (4-6 таб./сут) в течение 2-3 дней.

При *утяжелении симптомов алкогольной абстиненции* необходимо присоединить лекарственные средства, традиционно используемые в детоксикации.

Для *профилактики рецидивов* препарат принимают по 1-2 таб./сут в течение 2 -3 мес.

Побочное действие:

Наблюдались *единичные случаи* кратковременного (5 -10 мин) нарушения аккомодации (двоения в глазах).

Возможны реакции индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка:

При случайной передозировке возможны диспептические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем не рекомендуется назначать его пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не использовать по окончании срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Proproten-100