

[Пропротен-100](#)



Код АТХ:

- [N07BB](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Антитела к мозгоспецифическому белку S-100](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

♦ Таблетки для рассасывания	1 таб.
аффинно очищенные антитела к мозгоспецифическому белку S-100	3 мг

20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Разные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат модифицирует функциональную активность белка S-100, осуществляющего в мозге сопряжение информационных и метаболических процессов. Сенсибилизирует нейрональную мембрану, модулирует синаптическую пластичность нейронов. Оказывает модифицирующее действие на функциональное состояние структур мозга, участвующих в формировании алкогольной зависимости; гипоталамуса, гиппокампа и др.

При алкогольной зависимости оказывает нормализующее влияние на систему позитивного эмоционального подкрепления, что приводит к снижению частоты самостимуляции латерального гипоталамуса. Снижает пачечную активность нейронов гиппокампа; уменьшает количество циркулирующих иммунных комплексов в периферической крови, что коррелирует со снижением потребления этанола. Способствует усилению тормозных влияний ГАМК в ЦНС. Экспериментально установлено, что препарат восстанавливает нейромедиаторный баланс и условно-рефлекторную деятельность. Повышает устойчивость мозга к гипоксии и к токсическим воздействиям.

Препарат облегчает как психопатологические нарушения (беспокойство, психическое напряжение, бессонница, раздражительность, тревога, снижение настроения, интенсивное влечение к спиртному), так и соматовегетативные расстройства (слабость, потливость, головная боль, тремор, тахикардия, нарушения пищеварения) алкогольного "похмельного" синдрома.

Проявляет противоалкогольное действие, уменьшая влечение к алкоголю и снижая вероятность рецидивов.

Показания к применению:

— монотерапия алкогольного абстинентного синдрома легкой и средней степени тяжести.

Противопоказания:

- беременность;
- период лактации;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают по 1 таб. за 15-20 мин до еды. Таблетку следует держать во рту до полного растворения.

В состоянии похмелья первые 2 ч препарат принимают по 1 таб. каждые 30 мин; последующие 8-10 ч - по 1 таб. в час. В случае наступления сна прием возобновляют после пробуждения.

В дальнейшем при улучшении состояния препарат принимают по 1 таб. каждые 2-3 ч (4-6 таб./сут) в течение 2-3 дней.

При утяжелении симптомов алкогольной абстиненции необходимо присоединить лекарственные средства, традиционно используемые в детоксикации.

Для профилактики рецидивов препарат принимают по 1-2 таб./сут в течение 2-3 мес.

Побочное действие:

Наблюдались единичные случаи кратковременного (5-10 мин) нарушения аккомодации (двоения в глазах).

Возможны реакции индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка:

При случайной передозировке возможны диспептические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Пропротен-100

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем не рекомендуется назначать его пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не использовать по окончании срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Proproten-100>