

[Пророксан](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пророксан](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические.

	1 таб.
пророксана гидрохлорид	15 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 78 мг, крахмал картофельный - 5 мг, тальк - 1 мг, кальция стеарат - 1 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Альфа-адреноблокатор, действующий как на периферические, так и на центральные адренорецепторы, расположенные, в т.ч. в структурах заднего гипоталамуса. Снижает тонус гладкой мускулатуры артерий, уменьшает ОПСС и системное АД.

Показания к применению:

Профилактика симпатоадреналовых кризов с высоким АД при гипоталамическом синдроме.

Синдром Меньера, профилактика морской и воздушной болезни (в составе комбинированной терапии).

В качестве симптоматического средства при кожном зуде, при аллергодерматозах.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Воздушная болезнь](#)
- [Зуд](#)

Противопоказания:

ИБС, стенокардия, артериальная гипотензия, тяжелые формы церебрального атеросклероза, нарушения мозгового кровообращения (в т.ч. в анамнезе), хроническая сердечная недостаточность, детский возраст до 6 месяцев.

Способ применения и дозы:

Внутрь - по 15-30 мг 2-3 раза/сут. Максимальная разовая доза для взрослых - 60 мг, суточная - 180 мг.

Побочное действие:

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

Особые указания и меры предосторожности:

При применении у детей дозу устанавливают в зависимости от возраста.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Proroksan>