

## [Проспан \(сироп\)](#)



### Код АТХ:

- [R05CA](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Плюща листьев экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Сироп** светло-коричневого цвета, слегка мутноватый, с запахом вишни.

	<b>1 мл</b>
Сухой экстракт листьев плюща (5 - 7.5:1)*	7 мг

*Вспомогательные вещества:* калия сорбат - 1.34 мг, лимонная кислота безводная - 500 мкг, сорбитол жидкий кристаллизующийся - 550 мг, камедь ксантановая - 1.5 мг, ароматизатор вишневый - 3 мг, вода очищенная - 566.66 мг.

\* Экстрагент: этанол 30%.

100 мл - флаконы темного стекла (1) с пробкой-дозатором - пачки картонные.

200 мл - флаконы темного стекла (1) с пробкой-дозатором - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие.

Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

#### Фармакокинетика

Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

## **Показания к применению:**

— в качестве отхаркивающего средства в терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

## **Противопоказания:**

- дефицит сахаразы/изомальтазы;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь.

**Грудным детям (0-1 год)** - по 2.5 мл 2 раза/сут.

**Маленьким детям (1-6 лет)** - по 2.5 мл 3 раза/сут.

**Детям школьного возраста и подросткам** - по 5 мл 3 раза/сут.

**Взрослым** - по 5-7.5 мл 3 раза/сут.

Дозирование препарата производится с помощью мерного стаканчика.

Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Перед употреблением взбалтывать.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции.

Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбитола).

## **Передозировка:**

*Симптомы:* прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.

*Лечение:* отмена препарата; симптоматическая терапия.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат не рекомендуется.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.

В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата. Больным сахарным диабетом следует учитывать, что 2.5 мл сиропа содержат 0.963 г сорбитола, что соответствует 0.08 ХЕ.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Применение в детском возрасте**

**Грудным детям (0-1 год)** - по 2.5 мл 2 раза/сут.

**Маленьким детям (1-6 лет)** - по 2.5 мл 3 раза/сут.

**Детям школьного возраста и подросткам** - по 5 мл 3 раза/сут.

## **Условия хранения:**

Препарат хранить при температуре не выше 25°C.

Срок хранения после вскрытия флакона - 3 месяца.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Prospan\\_sirop](http://drugs.thead.ru/Prospan_sirop)