Проспан (сироп)



Код АТХ:

- R05CA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Плюща листьев экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп*** светло-коричневого цвета, слегка мутноватый, с запахом вишни.

	1 мл
сухой экстракт листьев плюща (5 - 7.5:1)*	7 мг

Вспомогательные вещества: калия сорбат - 1.34 мг, лимонная кислота безводная - 500 мкг, сорбитол жидкий кристаллизующийся - 550 мг, камедь ксантановая - 1.5 мг, ароматизатор вишневый - 3 мг, вода очищенная - 566.66 мг.

* *Экстрагент:* этанол 30%.

100 мл - флаконы темного стекла (1) с пробкой-дозатором - пачки картонные.
200 мл - флаконы темного стекла (1) с пробкой-дозатором - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие.

Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Фармакокинетика

Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

— в качестве отхаркивающего средства в терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания:

— дефицит сахаразы/изомальтазы;

— непереносимость фруктозы;

— глюкозо-галактозная мальабсорбция;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Грудным детям (0-1 год) - по 2.5 мл 2 раза/сут.

Маленьким детям (1-6 лет) - по 2.5 мл 3 раза/сут.

Детям школьного возраста и подросткам - по 5 мл 3 раза/сут.

Взрослым - по 5-7.5 мл 3 раза/сут.

Дозирование препарата производится с помощью мерного стаканчика.

Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Перед употреблением взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбитола).

Передозировка:

Симптомы: прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.

Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.

В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата. Больным сахарным диабетом следует учитывать, что 2.5 мл сиропа содержат 0.963 г сорбитола, что соответствует 0.08 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Грудным детям (0-1 год) - по 2.5 мл 2 раза/сут.

Маленьким детям (1-6 лет) - по 2.5 мл 3 раза/сут.

Детям школьного возраста и подросткам - по 5 мл 3 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре не выше 25°С.

Срок хранения после вскрытия флакона - 3 месяца.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prospan_sirop