

## [Простагерб Н](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>	<b>1 таб.</b>
экстракт корней крапивы стандартизированный	230 мг,
в т.ч. нативный сухой экстракт корней крапивы	161 мг
лактоза	69 мг

20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Нормализует диурез при доброкачественном увеличении предстательной железы: способствует увеличению объема и максимального оттока мочи, и уменьшению количества остаточной мочи, снижает дизурию, никтурию, болевые ощущения. Не влияет на объем увеличенной простаты.

### Показания к применению:

— комплексная терапия расстройств мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, в т.ч. аденоме I и II стадии.

### Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)

### Противопоказания:

- хроническая сердечная недостаточность;
- хроническая почечная недостаточность;
- повышенная индивидуальная чувствительность.

## **Способ применения и дозы:**

Внутрь по 1 таб., покрытой оболочкой, 3 раза/сут. Таблетку следует принимать, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды. Курс лечения - 2-6 месяцев.

## **Побочное действие:**

В редких случаях возможны слабовыраженные реакции со стороны пищеварительной системы (тошнота, изжога, чувство переполнения, диарея, метеоризм), аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, в т.ч. крапивница), проходящие после отмены препарата.

## **Передозировка:**

Случаев передозировки не наблюдалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат применяется только у мужчин.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не выявлены.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При появлении крови в моче или острой задержке мочи следует обратиться к лечащему врачу.

Указание для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.2 г углеводов, что соответствует 0.02 ХЕ.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Данные о влиянии препарата на способность к участию в дорожно-транспортном движении, либо в обслуживании машин, отсутствуют.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при хронической почечной недостаточности.

## **Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Prostagerb\\_N](http://drugs.thead.ru/Prostagerb_N)