

[Простагут форте](#)



Код АТХ:

- [G04CX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы. По 20 капс. в блистере из фольги алюминиевой и ПВХ-пленки; по 3 или 6 бл. помещают в картонную пачку.

Состав:

Капсулы	1 капс.
<i>активные вещества:</i>	
сереноа ползучей/пальмы сабаль плодов экстракт (10-14,3:1)	160 мг
экстрагент — этанол 90%	
крапивы корней экстракт сухой (7,6-12,5:1)	120 мг
экстрагент — этанол 60%	
<i>вспомогательные вещества</i>	
<i>содержимое капсулы:</i> триглицериды (триэфиры насыщенного глицерина C ₈ -C ₁₈ и жирных кислот) — 110-163,68 мг; соевых бобов масло гидрогенизированное — 10-63,68 мг; кремния диоксид	

Простагут форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

коллоидный — 6,32 мг	
<i>оболочка капсулы:</i> глицерин 85% (глицерол) — 64,838 мг; желатина полисукцинат — 137,446 мг; железа оксид черный (E172) — 0,896 мг; железа оксид желтый (E172) — 2,39 мг; патентованный синий V (E131) — 0,088 мг	

Описание:

Капсулы овальные зеленого цвета.

Содержимое капсул: масса маслянистой консистенции от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антиандрогенное, противовоспалительное.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противовоспалительное, противоотечное, иммуномодулирующее, антипролиферативное и антиандрогенное действие.

Противовоспалительное и противоотечное действие обусловлено ингибированием основных звеньев каскада арахидоновой кислоты и синтеза ПГ и ЛТ с последующим уменьшением проницаемости и как следствие — снижением боли, воспаления и отека тканей предстательной железы.

Иммуномодулирующее действие обусловлено подавлением аутоиммунного воздействия на ткань предстательной железы при воспалительных процессах, а также снижением пролиферации активных лимфоцитов.

Антипролиферативное и антиандрогенное действие связано с ингибированием ферментов ароматазы и 5 α -редуктазы, что, в свою очередь, препятствует образованию из тестостерона эстрадиола и дигидротестостерона, способствующих росту ткани предстательной железы.

Простагут® форте уменьшает симптомы нарушения мочеиспускания, обусловленные ДГПЖ, снижает боль и чувство жжения при мочеиспускании, способствует быстрому опорожнению мочевого пузыря и снижает частоту ложных и ночных позывов к мочеиспусканию. Не оказывает влияние на сексуальную активность.

Фармакокинетика

Действие препарата Простагут форте является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

- нарушения мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I и II степени;
- нарушения мочеиспускания при простатите;
- профилактика рецидивов доброкачественной гиперплазии предстательной железы после операции.

Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

Противопоказания:

Простагут форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь по 1 капсуле 2 раза/сут (утром и вечером). Капсулы следует проглатывать, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды.

Продолжительность лечения - не менее 30 дней.

Побочное действие:

Редко: раздражение слизистой оболочки желудка (при приеме препарата натощак).

Возможны: аллергические реакции.

Простагут форте характеризуется хорошей переносимостью.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Простагут форте не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет соответствующих показаний к применению у женщин. Нет данных об экскреции с грудным молоком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Простагут форте не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Баланит, баланопостит, фимоз
- Варикоцеле
- Гидронефроз
- Гломерулонефрит

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Простагут форте

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: http://drugs.thead.ru/Prostagut_forte