Простакор (лиофилизат)



Код АТХ:

- G04BX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения в виде порошка или пористой массы белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 амп.
экстракт простаты животных*	5 мг

* препарат полипептидной природы, получаемый путем экстракции из предстательной железы крупного рогатого скота.

Вспомогательные вещества: глицин.

5 мг - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
5 мг - ампулы (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — нормализующее обмен веществ в предстательной железе.

Фармакодинамика

Обладает органотропным действием на простату, способствует уменьшению отека, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает количество лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря, уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью.

Фармакокинетика

Как пептидное вещество, расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Не обладает кумулятивным действием.

Показания к применению:

Хронический простатит; доброкачественная гиперплазия предстательной железы; состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Лечение ургентного недержания мочи, ургентных позывов к мочеиспусканию и учащенного мочеиспускания при неосложненных формах гиперактивности мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы
- Простатит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к активному веществу; возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, ректально, в/м. Доза и частота применения зависит от показаний и применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Аллергические реакции: очень редко - крапивница.

При ректальном применении: часто - зуд заднего прохода; нечасто - диарея, метеоризм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Баланит, баланопостит, фимоз
- Варикоцеле
- Гидронефроз
- Гломерулонефрит

Особые указания и меры предосторожности:

Препараты, содержащие экстракт предстательной железы, не являются взаимозаменяемыми, поэтому следует строго соблюдать показания к применению для каждого из них.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно проводить стандартный контроль данного заболевания. Перед началом лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prostakor_liofilizat