

## [Простакор \(лиофилизат\)](#)



### Код АТХ:

- [G04BX](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения** в виде порошка или пористой массы белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	<b>1 амп.</b>
экстракт простаты животных*	5 мг

\* препарат полипептидной природы, получаемый путем экстракции из предстательной железы крупного рогатого скота.

Вспомогательные вещества: глицин.

5 мг - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

5 мг - ампулы (10) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — нормализующее обмен веществ в предстательной железе.

#### **Фармакодинамика**

Обладает органотропным действием на простату, способствует уменьшению отека, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает количество лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря, уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью.

#### **Фармакокинетика**

Как пептидное вещество, расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Не обладает кумулятивным действием.

### Показания к применению:

## Простакор (лиофилизат)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Хронический простатит; доброкачественная гиперплазия предстательной железы; состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Лечение ургентного недержания мочи, ургентных позывов к мочеиспусканию и учащенного мочеиспускания при неосложненных формах гиперактивности мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах.

### Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к активному веществу; возраст до 18 лет.

### Способ применения и дозы:

Внутрь, ректально, в/м. Доза и частота применения зависит от показаний и применяемой лекарственной формы.

### Побочное действие:

*Аллергические реакции:* очень редко - крапивница.

*При ректальном применении:* часто - зуд заднего прохода; нечасто - диарея, метеоризм.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Баланит, баланопостит, фимоз
- Варикоцеле
- Гидронефроз
- Гломерулонефрит

### Особые указания и меры предосторожности:

Препараты, содержащие экстракт предстательной железы, не являются взаимозаменяемыми, поэтому следует строго соблюдать показания к применению для каждого из них.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно проводить стандартный контроль данного заболевания. Перед началом лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Prostakor\\_liofilizat](http://drugs.thead.ru/Prostakor_liofilizat)