

## Простаплант



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Пальмы ползучей плодов экстракт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Капсулы** зеленого цвета, желатиновые, овальные, со швом; содержимое капсул - масса маслянистой консистенции от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с характерным запахом.

	<b>1 капс.</b>
сухой экстракт плодов серенои ползучей (10-14.3:1)*	320 мг

*Вспомогательные вещества:* желатина полисукцинат, глицерол, краситель железа оксид черный (E172), краситель железа оксид желтый (E172), краситель патентованный синий V (E131).

\* экстрагент: этанол 90%.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.  
10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.  
20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.  
20 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Фитопрепарат, применяемый при функциональных нарушениях мочеиспускания, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Оказывает антиандрогенное, противовоспалительное и противоотечное действие избирательно на ткани предстательной железы.

Механизм антиандрогенного действия обусловлен ингибированием активности 5-альфа-редуктазы (вследствие чего

## Простаплант

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

нарушается трансформация тестостерона в дигидротестостерон). Простаплант препятствует образованию дигидротестостерон-рецептор-комплекса, проникновению его в ядро клетки и последующему индуцированию синтеза белка. В результате данного действия тормозится процесс пролиферативных изменений в тканях предстательной железы. Простаплант не влияет на уровни тестостерона, ФСГ и ЛГ в плазме крови у мужчин.

Противовоспалительное и противоотечное действие препарата обусловлено ингибированием ферментов - циклооксигеназы и 5-липоксигеназы.

Простаплант уменьшает капиллярную проницаемость и сосудистый стаз, уменьшает отек и воспаление предстательной железы, устраняя таким образом компрессию на шейку мочевого пузыря и уретру, улучшая динамику мочевыводящих путей.

Применение препарата способствует уменьшению специфических симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы (дизурия, поллакурия, никтурия, снижение объема и силы мочеиспускания, неполное опорожнение мочевого пузыря, болезненные ощущения и чувство напряжения в промежности на I и II стадии заболевания).

Простаплант не снижает потенцию, не оказывает влияния на уровень простат-специфического антигена (ПСА) в плазме крови.

### **Фармакокинетика**

Действие препарата Простаплант является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

## **Показания к применению:**

— нарушения мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I и II стадии.

## **Относится к болезням:**

- [Гиперплазия предстательной железы](#)

## **Противопоказания:**

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Назначают по 1 капсуле 1 раз/сут.

Капсулы принимают не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Продолжительность курса лечения - не менее 3 мес.

Оптимальную схему и повторные курсы лечения устанавливает и назначает врач индивидуально в каждом случае на основе диагностического обследования.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - тошнота, изжога, гастралгия (особенно при приеме препарата натощак).

*Прочие:* возможны аллергические реакции.

## **Передозировка:**

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Простаплант не сообщалось.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

## **Простаплант**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата Простаплант не выявлено.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью следует назначать препарат пациентам с заболеваниями ЖКТ в анамнезе.

Перед применением препарата следует убедиться в том, что заболевание носит доброкачественный характер.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

### **Срок годности:**

5 лет.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Prostaplant>