

## Простатилен



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Суппозитории ректальные** торпедообразной формы, от белого до желтого цвета, допускается мраморность; на срезе допускается мраморность, наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

	<b>1 супп.</b>
экстракт простаты*	30 мг

*Вспомогательные вещества:* диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 - достаточное количество для получения суппозитория массой 2.8 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

◇ **Суппозитории ректальные** торпедообразной формы, от белого до желтого цвета, допускается мраморность; на срезе допускается мраморность, наличие воздушного стержня или торпедообразного углубления.

	<b>1 супп.</b>
экстракт простаты*	50 мг

*Вспомогательные вещества:* диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 - достаточное количество для получения суппозитория массой 2.8 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

\* субстанция представляет собой экстракт простаты с добавлением глицина.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Препарат животного происхождения. Обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

#### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

## **Показания к применению:**

- хронический абактериальный простатит;
- состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

## **Относится к болезням:**

- [Гиперплазия предстательной железы](#)

## **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Суппозитории 30 мг вводят ректально по 1 шт. 1 раз/сут (утром или вечером) или 2 раза/сут (утром и вечером).

Суппозитории 50 мг вводят ректально по 1 шт. 1 раз/сут (утром или вечером).

Суппозиторий вводят глубоко в задний проход после дефекации или очистительной клизмы. Перед применением суппозиторий следует смочить водой. После введения желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 минут. Курс лечения - не менее 10 дней *при хроническом простатите*, не менее 15 дней - *при доброкачественной гиперплазии предстательной железы*.

## **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* крапивница.

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить лечение, назначить антигистаминные препараты.

## **Передозировка:**

Препарат Простатилен не токсичен, случаев передозировки не наблюдалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Женщинам препарат не назначается.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Совместим с антибактериальными препаратами, применяемыми для лечения простатита.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций, например, управление транспортными средствами.

## **Условия хранения:**

## **Простатилен**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2° до 15°С.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Prostatilen>