Простатилен



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные*** торпедообразной формы, от белого до желтого цвета, допускается мраморность; на срезе допускается мраморность, наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

	1 супп.
экстракт простаты*	30 мг

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 - достаточное количество для получения суппозитория массой 2.8 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

◊ ***Суппозитории ректальные*** торпедообразной формы, от белого до желтого цвета, допускается мраморность; на срезе допускается мраморность, наличие воздушного стержня или торпедообразного углубления.

	1 супп.
экстракт простаты*	50 мг

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 - достаточное количество для получения суппозитория массой 2.8 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

* субстанция представляет собой экстракт простаты с добавлением глицина.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат животного происхождения. Обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

— хронический абактериальный простатит;

— состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе;

— доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Суппозитории 30 мг вводят ректально по 1 шт. 1 раз/сут (утром или вечером) или 2 раза/сут (утром и вечером).

Суппозитории 50 мг вводят ректально по 1 шт. 1 раз/сут (утром или вечером).

Суппозиторий вводят глубоко в задний проход после дефекации или очистительной клизмы. Перед применением суппозиторий следует смочить водой. После введения желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 минут. Курс лечения - не менее 10 дней *при хроническом простатите*, не менее 15 дней - при *доброкачественной гиперплазии предстательной железы.*

Побочное действие:

Аллергические реакции: крапивница.

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить лечение, назначить антигистаминные препараты.

Передозировка:

Препарат Простатилен не токсичен, случаев передозировки не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Женщинам препарат не назначается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с антибактериальными препаратами, применяемыми для лечения простатита.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций, например, управление транспортными средствами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2° до 15°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prostatilen