Простатилен (лиофилизат)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Простаты экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения в виде порошка или пористой массы белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 амп.
экстракт простаты (в пересчете на водорастворимые пептиды)	5 мг

Вспомогательные вещества: глицин - 25 мг.

5 мг - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 мг - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
5 мг - ампулы бесцветного стекла (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат животного происхождения. Обладает органотропным действием на предстательную железу. Способствует уменьшению отека, застоя секрета и лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы. Нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток. Оказывает противовоспалительное действие. За счет антиагрегантных свойств препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

— хронический простатит;

— состояния после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Противопоказания:

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/м по 5-10 мг 1 раз/сут. Перед введением лиофилизат растворяют в 1-2 мл 0.9% раствора натрия хлорида, или 0.25-0.5% раствора новокаина, или воды для инъекций. Длительность лечения составляет 5-10 дней. При необходимости курс может быть повторен через 1-6 мес.

При пропуске одного или нескольких введений препарата лечение не прекращают, рекомендовано удлинение курса лечения на количество пропущенных дней приема.

Побочное действие:

Аллергические реакции: крапивница.

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить лечение, назначить антигистаминные препараты.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Простатилен не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Женщинам препарат не назначается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых последствий взаимодействия препарата Простатилен с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Особенностей действия при первом приеме и при его отмене препарат не имеет. Применение препарата при хронических заболеваниях особенностей не имеет.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, работать с движущимися механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказано назначение детям до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prostatilen_liofilizat