

## [Простатилен \(лиофилизат\)](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Простаты экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения** в виде порошка или пористой массы белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                            | <b>1 амп.</b> |
| экстракт простаты (в пересчете на водорастворимые пептиды) | 5 мг          |

*Вспомогательные вещества:* глицин - 25 мг.

5 мг - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 мг - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

5 мг - ампулы бесцветного стекла (5) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат животного происхождения. Обладает органотропным действием на предстательную железу. Способствует уменьшению отека, застоя секрета и лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы. Нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток. Оказывает противовоспалительное действие. За счет антиагрегантных свойств препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

#### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

## Показания к применению:

- хронический простатит;
- состояния после оперативных вмешательств на предстательной железе.

## Противопоказания:

- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/м по 5-10 мг 1 раз/сут. Перед введением лиофилизат растворяют в 1-2 мл 0.9% раствора натрия хлорида, или 0.25-0.5% раствора новокаина, или воды для инъекций. Длительность лечения составляет 5-10 дней. При необходимости курс может быть повторен через 1-6 мес.

При пропуске одного или нескольких введений препарата лечение не прекращают, рекомендовано удлинение курса лечения на количество пропущенных дней приема.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* крапивница.

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить лечение, назначить антигистаминные препараты.

## Передозировка:

Случаи передозировки препарата Простатилен не описаны.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Женщинам препарат не назначается.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых последствий взаимодействия препарата Простатилен с другими лекарственными средствами не выявлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

Особенностей действия при первом приеме и при его отмене препарат не имеет. Применение препарата при хронических заболеваниях особенностей не имеет.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, работать с движущимися механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Применение в детском возрасте**

## **Простатилен (лиофилизат)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Противопоказано назначение детям до 18 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Prostatilen\\_lyofilizat](http://drugs.thead.ru/Prostatilen_lyofilizat)