Простатилен (свечи)



Код АТХ:

- G04BX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Простаты экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Суппозитории ректальные*** торпедообразной формы, от белого до желтого цвета, допускается мраморность; на срезе допускается мраморность, наличие воздушного стержня или торпедообразного углубления.

	1 супп.
экстракт простаты*	50 мг

* субстанция Простатилен представляет собой экстракт простаты с добавлением глицина.

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 - достаточное количество для получения суппозитория массой 2.8 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Показания к применению:

— хронический абактериальный простатит;

— состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе;

— доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы
- Простатит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Суппозитории вводят ректально по 1 шт. (50 мг) 1 раз/сут (утром или вечером).

Суппозиторий вводят глубоко в задний проход после дефекации или очистительной клизмы. Перед применением суппозиторий следует смочить водой. После введения желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 минут.

Курс лечения - не менее 10 дней *при хроническом простатите*, не менее 15 дней - при *доброкачественной гиперплазии предстательной железы.*

Побочное действие:

Аллергические реакции: крапивница.

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить лечение, назначить антигистаминные препараты.

Передозировка:

Препарат Простатилен не токсичен, случаев передозировки не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Женщинам препарат не назначается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с антибактериальными препаратами, применяемыми для лечения простатита.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Простатилен не влияет на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций, например, управление транспортными средствами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2° до 15°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prostatilen_svechi