

Простатилен (свечи)



Код АТХ:

- [G04BX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Простаты экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Суппозитории ректальные** торпедообразной формы, от белого до желтого цвета, допускается мраморность; на срезе допускается мраморность, наличие воздушного стержня или торпедообразного углубления.

	1 супп.
экстракт простаты*	50 мг

* субстанция Простатилен представляет собой экстракт простаты с добавлением глицина.

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 - достаточное количество для получения суппозитория массой 2.8 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Показания к применению:

- хронический абактериальный простатит;
- состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Суппозитории вводят ректально по 1 шт. (50 мг) 1 раз/сут (утром или вечером).

Суппозиторий вводят глубоко в задний проход после дефекации или очистительной клизмы. Перед применением суппозиторий следует смочить водой. После введения желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 минут.

Курс лечения - не менее 10 дней *при хроническом простатите*, не менее 15 дней - *при доброкачественной гиперплазии предстательной железы*.

Побочное действие:

Аллергические реакции: крапивница.

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить лечение, назначить антигистаминные препараты.

Передозировка:

Препарат Простатилен не токсичен, случаев передозировки не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Женщинам препарат не назначается.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместим с антибактериальными препаратами, применяемыми для лечения простатита.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Простатилен не влияет на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций, например, управление транспортными средствами.

Простатилен (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2° до 15°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Prostatilen_svechi