Противогеморроидальный Сбор



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кориандра плоды
- Крушины ольховидной кора
- Сенны остролистной листья
- Солодки корни
- Тысячелистника обыкновенного трава

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное средство растительного происхождения. Оказывает слабительное, вяжущее, спазмолитическое, противовоспалительное и гемостатическое действие.

Показания к применению:

— регулирование стула у пациентов с геморроем;

— атонические запоры.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Запор

Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения);

— беременность;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Принимать внутрь, в виде настоя.

Измельченное сырье: 5-6 г (1 ст. ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Фильтр-пакеты: 2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают в течение 15 мин, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Полученный настой принимают по 1/2-1 стакану на ночь. Длительность лечения определяется характером заболевания, достигнутым эффектом и сопутствующей терапией. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Аллергические реакции. При длительном применении возможны запор, жажда, снижение массы тела, головная боль, кардиалгия, гипокалиемия

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Готовый отвар можно хранить в прохладном месте не более 48 ч.

Источник: http://drugs.thead.ru/Protivogemorroidalnyy_Sbor