

[Противомозольная мазь](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Молочная кислота](#)
- [Салициловая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает прижигающим действием, коагулирует белки.

Показания к применению:

— бородавки.

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- пигментный невус;
- волосистые бородавки;
- локализация бородавок в области лица или гениталий;
- детский возраст (до 2 лет).

С *осторожностью* назначают препарат при почечной недостаточности, детям в возрасте от 2 до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно, с помощью кисточки-аппликатора. Препарат наносят на пораженные участки кожи по 1 или несколько капель (достаточное количество для покрытия) 1-2 раза/сут. Препарат оставляют на коже до полного высыхания, после чего при необходимости накладывают пластырь.

Противомозольная мазь

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Максимальная суточная наносимая доза для взрослых - 10 мл, для детей - 1 мл. Курс лечения - не более 7 дней.

Побочное действие:

Раздражение кожи (гиперемия, жжение), кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: раздражение кожи.

Лечение: удалить препарат с поверхности кожи путем обильного промывания водой.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности обрабатываемая поверхность кожи должна быть не более 5 см².

В период лактации следует избегать случайного приема препарат внутрь младенцем путем контакта с обработанными поверхностями.

Особые указания и меры предосторожности:

При лечении детей не следует обрабатывать несколько участков одновременно.

Раствор необходимо наносить осторожно, избегая попадания на здоровую кожу.

При нарушениях функции почек

С осторожностью назначают препарат при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 2 лет).

С осторожностью назначают препарат детям в возрасте от 2 до 12 лет. При лечении детей не следует обрабатывать несколько участков одновременно.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Protivomozolnaya_maz