

Псило-бальзам



Код АТХ:

- [D04AA32](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Дифенгидрамин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения 1%** бесцветный, прозрачный, однородный.

	1 г
дифенгидрамина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: цетилпиридиния хлорид - 1 мг, макрогола глицерилкаприлокапрат (софтиген 767) - 150 мг, полиакриловая кислота - 12 мг, трометамол - 22.2 мг, вода очищенная - 804.8 мг.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедянты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоаллергическое средство, блокатор гистаминовых H₁-рецепторов. Обладает выраженной антигистаминной активностью, уменьшает повышенную проницаемость капилляров, отек тканей и гиперемию. Оказывает местное анестезирующее действие.

Дифенгидрамин оказывает выраженное противоаллергическое действие, быстро уменьшает зуд.

Псило-Бальзам обладает охлаждающим действием. Специальная гелевая основа защищает кожу и не оставляет видимого следа.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Псило-Бальзам не предоставлены.

Показания к применению:

- солнечные ожоги и ожоги I степени;
- укусы насекомых;
- крапивница;
- кожный зуд различного генеза;
- зудящая экзема;
- ветряная оспа;
- аллергические раздражения кожи (за исключением зуда при холестазах);
- контактные дерматиты, вызванные соприкосновением с растениями.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Астения](#)
- [Ветряная оспа](#)
- [Ветрянка](#)
- [Зуд](#)
- [Крапивница](#)
- [Ожоги](#)
- [Холера](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует наносить на пораженные участки кожи тонким слоем (2-3 г) 3-4 раза/сут, слегка втирая.

Побочное действие:

Аллергические реакции: возможны кожные проявления.

Передозировка:

Симптомы: при нанесении препарата на большие поверхности возможна интоксикация - сухость во рту, затрудненное дыхание, возбуждение, спутанность сознания.

Лечение: симптоматическая терапия на фоне тщательного контроля функции дыхания и АД.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Следует с осторожностью применять препарат при беременности.

В период лечения грудное вскармливание рекомендуется приостановить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Псило-бальзам

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Псило-Бальзам не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит легкие жировые компоненты, его можно применять в качестве крема для кожи.

Во время лечения Псило-Бальзамом пациент должен избегать солнечного облучения и употребления алкоголя.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Во время лечения пациент должен соблюдать осторожность при видах деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Psilo-balzam>