

Псориатен



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь** гомогенная, светло-бежевого цвета; возможно небольшое выделение масла в области отверстия тубы, что не является признаком нестабильности и безопасно.

	10 г
матричная настойка Mahonia aquifolium D1	1 г

Вспомогательные вещества: ланолин, спиртовая мазь на основе ланолина (из спиртов на основе ланолина, вазелина белого, цетилстеаринового спирта), парафин густой, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при псориазе. Mahonia aquifolium (магония подуболистная) содержит активные компоненты, алкалоиды, основным из которых является берберин.

Препарат оказывает противовоспалительное действие (за счет снижения активности ферментов циклооксигеназы и 5-липоксигеназы, нарушения синтеза арахидоновой кислоты, лейкотриенов, простагландинов, тромбксана, а также связывания свободных радикалов) и антипролиферативное действие (за счет торможения синтеза протеинов, РНК, ДНК, а также косвенного воздействия на биохимические процессы, необходимые для размножения клеток и синтеза медиаторов воспаления). Кроме того, берберин является антагонистом калмодулина, который участвует в регуляции обмена кальция в клетках и играет существенную роль в процессах роста и размножения клеток.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Псориатен не изучена.

Показания к применению:

— лечение псориаза и других кожных заболеваний, сопровождающихся сухостью и шелушением кожи (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Псориаз](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата (например, к спирту на основе ланолина).

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 1 года мазь наносят тонким слоем на пораженные участки, слегка втирая, 3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко: аллергические кожные реакции (на компоненты мазевой основы).

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Псориатен не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Псориатен при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Псориатен с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении Псориатена возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Псориатена возможно использование других лекарственных препаратов.

Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия терапевтического эффекта в течение 3 недель следует проконсультироваться с врачом.

Применение в детском возрасте

Детям старше 1 года мазь наносят тонким слоем на пораженные участки, слегка втирая, 3 раза/сут.

Условия хранения:

Псориатен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Psoriaten>