

[Псоринохель Н](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Psorinum-Nosode (псоринум-нозод) D10	1.1 мкл
Medorrhinum-Nosode (медорринум-нозод) D12	1.1 мкл
Sulfur (сульфур) D6	1.1 мкл
Thuja occidentalis (Thuja) (туя окциденталис (туя)) D6	1.1 мкл
Bufo bufo (буфо буфо) D10	1.1 мкл
Natrium chloratum (натриум хлоратум) D12	1.1 мкл
Vaccinium-Nosode (вакцининум-нозод) D8	1.1 мкл
Bismutum kalium iodidum (бисмутум калиум йодидум) D5	0.55 мкл
Nerium oleander (Oleander) (нериум олеандер (олеандер)) D4	0.55 мкл
Cicuta virosa (цикута вироза) D5	0.55 мкл
Bacillinum humanum-Nosode (бациллинум гуманум-нозод) D12	0.55 мкл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

1.1 мл (1.1 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

1.1 мл (1.1 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Показания к применению:

— экзема.

Относится к болезням:

- [Экзема](#)

Противопоказания:

- возраст до 18 лет;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначается внутримышечно по 1.1 мл через день в течение 4 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно с учетом предполагаемой пользы для матери и потенциального риска для плода и младенца.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также при появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Псоринохель Н

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: http://drugs.thead.ru/Psorinohel_N