

Пульмекс Бэби



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения** белого цвета, однородная, с запахом эфирных масел.

	1 г
масло розмарина	50 мг
масло листьев эвкалипта прутовидного	50 мг
перуанский бальзам	60 мг

Вспомогательные вещества: карбомер 974Р - 1.2%, натрия гидроксид (раствор 30%) - 0.92%, полисорбат 20 - 5%, вода очищенная - около 76.88%.

20 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Оказывает отхаркивающее, антисептическое, противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Показания к применению:

У детей в возрасте от 6 мес до 3 лет в составе комплексной терапии воспалительных и инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем:

- острый бронхит;
- хронический бронхит;
- трахеобронхит;
- трахеит;
- ОРЗ, "простуда".

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Инфекции](#)
- [Трахеит](#)
- [Трахеобронхит](#)

Противопоказания:

- эпилептический синдром (в анамнезе);
- детский возраст до 6 месяцев;
- повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения препарата;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. **Детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет** небольшое количество мази наносят 2 раза/сут на верхнюю и среднюю части груди и спины. Слегка втирают до полного впитывания и прикрывают сухой теплой тканью.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Родители ребенка должны быть информированы, что при развитии каких-либо побочных реакций следует сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка:

Симптомы передозировки (при случайном приеме препарата внутрь), обусловленные наличием в составе препарата эвкалиптового масла: тошнота, рвота, спастические боли в животе, головная боль, выраженное головокружение, покраснение кожи лица, затруднение дыхания, делирий, судороги, угнетение ЦНС, кома.

Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, солевого слабительного. Неотложная помощь проводится в условиях стационара: при судорогах - в/в введение диазепама или применение барбитуратов короткого действия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не применимо (препарат не предназначен для применения у данной группы пациентов).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении препарата Пульмекс Бэби не было отмечено клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Нельзя наносить мазь на слизистые оболочки (особенно носа и рта), на ожоговые поверхности или на поврежденную кожу.

При попадании в глаза или на слизистую оболочку промыть холодной водой.

Препарат предназначен только для наружного применения. Препарат нельзя принимать внутрь.

Пульмекс Бэби

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Мазь Пульмекс Бэби не оставляет жирных следов и пятен на одежде.

Мазь Пульмекс Бэби не раздражает здоровую кожу.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 6 месяцев.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pulmeks_Bebi