Пумпан

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли гомеопатические*** в виде прозрачной, от желтоватого до красновато-желтого цвета жидкости, без специфического запаха.

	100 мл
боярышник (Crataegus) D1	20 мл
арника горная (Arnica) D6	10 мл
калия карбонат (Kalium carbonicum) D6	10 мл
наперстянка пурпурная (Digitalis) D12	10 мл
ландыш майский (Convallaria) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

◊ ***Таблетки подъязычные гомеопатические*** круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской, почти белого цвета с возможными вкраплениями и мраморностью, без запаха.

	1 таб.
боярышник (Crataegus) D1	74.8 мг
арника горная (Arnica) D6	37.2 мг
калия карбонат (Kalium carbonicum) D6	37.2 мг
наперстянка пурпурная (Digitalis) D12	37.2 мг
ландыш майский (Convallaria) D12	37.2 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, магния стеарат, лактозы моногидрат.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
12 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат. Входящие в состав препарата боярышник (Crataegus), арника (Arnica), наперстянка (Digitalis), ландыш майский (Convallaria), карбонат калия увеличивают силу сокращений миокарда, урежают сердечный ритм, расширяют коронарные артерии, улучшают кровоснабжение миокарда, снижают частоту и интенсивность приступов стенокардии. Пумпан снижает возбудимость нервной системы, оказывает антигипертензивное, антиангинальное и антиоксидантное действие, улучшает реологические свойства крови, микроциркуляцию и метаболизм клеток миокарда, уменьшает перекисное окисление липидов, увеличивает диурез.

Фармакокинетика

Действие препарата Пумпан является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии при:

— ИБС;

— артериальной гипертензии;

— хронической сердечной недостаточности I-II стадии;

— нейроциркуляторной дистонии.

Относится к болезням:

- Артериальная гипертензия
- Гипертензия
- Нейроциркуляторная дистония
- Сердечная недостаточность

Противопоказания:

— алкогольная зависимость;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При ИБС **взрослым** назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 1-2 мес. При стабилизации состояния переходят на поддерживающую терапию 2 раза/сут.

При *артериальной гипертензии* **взрослым и подросткам** назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2-3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 2 раза/сут под контролем АД.

При *хронической сердечной недостаточности I-II стадии* **взрослым и подросткам** назначают по 1 таб. или 10 капель, **детям до 12 лет** - по 1/2 таб. или 5 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2-3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 2 раза/сут.

При *нейроциркуляторной дистонии* **взрослым и подросткам** назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2-3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 2 раза/сут.

В *начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов*, возможно назначение препарата **взрослым и подросткам** по 8-10 капель, **детям до 12 лет** - по 5 капель каждые 0.5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Пумпан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Пумпан с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку препарат Пумпан в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения:

Препарат в форме таблеток подъязычных следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света, недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Препарат в форме капель гомеопатических следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Срок годности - 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Pumpan