

РЕМАКСОЛ



Код АТХ:

- [A05BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Инозин](#)
- [Меглюмин](#)
- [Метионин](#)
- [Никотинамид](#)
- [Янтарная кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [Википедия](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#) [англ](#)

Форма выпуска:

Раствор для инфузий прозрачный, бесцветный, со слабым характерным запахом.

	1 л
янтарная кислота	5.28 г
меглюмин (N-метилглюкамин)	8.725 г
инозин (рибоксин)	2 г
метионин	750 мг
никотинамид	250 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 6 г, калия хлорид - 0.3 г, магния хлорид - 0.12 г, натрия гидроксид - 1.788 г, вода д/и - до 1 л.

400 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сбалансированный инфузионный раствор, обладающий гепатопротекторным действием.

Под действием препарата ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргических соединений, повышается устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов, восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты. Ремаксол снижает цитолиз, что проявляется в снижении индикаторных ферментов: АЛТ и АСТ.

Ремаксол способствует снижению содержания билирубина и его фракций, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь. Снижает активность экскреторных ферментов гепатоцитов - ЩФ и ГГТ, способствует окислению холестерина в желчные кислоты.

Фармакокинетика

При в/в капельном введении входящие в состав естественные компоненты быстро распределяются в тканях организма, утилизируясь практически мгновенно.

Продукты метаболизма выводятся с мочой и не накапливаются в организме.

Показания к применению:

— нарушения функции печени вследствие острого или хронического ее повреждения (токсические, алкогольные, лекарственные гепатиты);

— в комплексном лечении вирусных гепатитов (дополнительно к этиотропной терапии).

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период лактации;
- детский возраст;
- индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при нефролитиазе, подагре, гиперурикемии.

Способ применения и дозы:

Ремаксол вводят только в/в капельно в суточной дозе от 400 мл до 800 мл в течение 3-12 дней в зависимости от тяжести заболевания. Скорость введения 40-60 капель (2-3 мл)/мин.

Побочное действие:

Со стороны организма в целом: при быстром введении раствора - гиперемия кожных покровов различной степени выраженности, чувство жара, першение в горле, сухость во рту (не требующие отмены препарата).

Аллергические реакции: сыпь и кожный зуд (устраняются применением антигистаминных препаратов).

Со стороны обмена веществ: снижение концентрации глюкозы и увеличение содержания мочевой кислоты в крови (ввиду активации препаратом аэробных процессов в организме).

Прочие: редко - тошнота, головная боль и головокружение.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Ремаксол с другими лекарственными средствами не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется смешивание в одном флаконе с другими лекарственными средствами для в/в введения.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/REMAKSOL>