

[Радевит Актив](#)



Код АТХ:

- [D02AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения	100 г
α-токоферола ацетат	5 мг
ретинола пальмитат	10 мг
эргокальциферол	50 мкг

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный дерматопротекторный препарат для местного применения. Оказывает противовоспалительное, смягчающее, увлажняющее, репаративное и противозудное действие, нормализует процессы ороговения, усиливает защитную функцию кожи.

Показания к применению:

- ихтиоз, ихтиозоформные дерматозы (в составе комплексной терапии);
- себорейный дерматит;
- трещины, эрозии кожи;
- ожоги;
- неинфицированные раны, язвы;
- экзема;
- атопический дерматит;
- диффузный нейродермит;
- аллергический контактный дерматит (вне обострения).

Профилактика воспалительных и аллергических заболеваний кожи в период ремиссии, после прекращения лечения мазями, содержащими ГКС; при легкораздражимой коже, в т.ч. с повышенной чувствительностью к косметическим средствам.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Дерматит](#)
- [Ихтиоз](#)
- [Нейродермит](#)
- [Ожоги](#)
- [Раны](#)
- [Себорея](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- гипервитаминоз А;
- гипервитаминоз Е;
- гипервитаминоз D;
- прием ретиноидов;
- беременность;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на кожу в области поражения 2 раза/сут (утром и перед сном).

При сильном шелушении кожи накладывают окклюзионную повязку, прекращающую доступ воздуха к пораженному участку. Перед нанесением препарата на трещины и другие дефекты кожи необходима их предварительная обработка антисептическими средствами.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Применение препарата при острых воспалительных заболеваниях кожи может вызывать усиление зуда и красноты кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Радевит Актив

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Препарат Радевит противопоказан к применению при беременности.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в холодильнике при температуре от 4 до 10°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Radevit_Aktiv