Радевит Актив



Код АТХ:

- D02AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения***	**100 г**
α-токоферола ацетат	5 мг
ретинола пальмитат	10 мг
эргокальциферол	50 мкг

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный дерматопротекторный препарат для местного применения. Оказывает противовоспалительное, смягчающее, увлажняющее, репаративное и противозудное действие, нормализует процессы ороговения, усиливает защитную функцию кожи.

Показания к применению:

— ихтиоз, ихтиозоформные дерматозы (в составе комплексной терапии);

— себорейный дерматит;

— трещины, эрозии кожи;

— ожоги;

— неинфицированные раны, язвы;

— экзема;

— атопический дерматит;

— диффузный нейродермит;

— аллергический контактный дерматит (вне обострения).

Профилактика воспалительных и аллергических заболеваний кожи в период ремиссии, после прекращения лечения мазями, содержащими ГКС; при легкораздражимой коже, в т.ч. с повышенной чувствительностью к косметическим средствам.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Дерматит
- Ихтиоз
- Нейродермит
- Ожоги
- Раны
- Себорея
- Экзема

Противопоказания:

— гипервитаминоз A;

— гипервитаминоз E;

— гипервитаминоз D;

— прием ретиноидов;

— беременность;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на кожу в области поражения 2 раза/сут (утром и перед сном).

При сильном шелушении кожи накладывают окклюзионную повязку, прекращающую доступ воздуха к пораженному участку. Перед нанесением препарата на трещины и другие дефекты кожи необходима их предварительная обработка антисептическими средствами.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Применение препарата при острых воспалительных заболеваниях кожи может вызывать усиление зуда и красноты кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Радевит противопоказан к применению при беременности.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в холодильнике при температуре от 4 до 10°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Radevit_Aktiv