Раунатин

Код АТХ:

- C02AA53

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Раувольфии алкалоиды

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Раувольфии алкалоиды обладают гипотензивным и антиаритмическим действием. Седативное влияние выражено меньше, чем у резерпина, но по гипотензивному действию практически не уступают резерпину, при этом в ряде случаев переносятся лучше.

Гипотензивный эффект развивается медленнее, чем у резерпина.

Показания к применению:

— артериальная гипертензия легкой и средней степени тяжести.

Относится к болезням:

- Гипертензия

Противопоказания:

— артериальная гипотензия;

— депрессия;

— недостаточность коронарного кровообращения;

— органические поражения миокарда;

— аортальные пороки;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— нефросклероз;

— беременность (III триместр);

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к алкалоидам раувольфии.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды. В 1-й день принимают 1 таб. (2 мг - в пересчете на сумму алкалоидов) на ночь; во 2-й день - по 1 таб. 2 раза/сут, на 3-й день - 3 таб., постепенно увеличивая общую дозу до 4-6 таб./сут.

После достижения терапевтического эффекта (через 10-14 дней) дозу постепенно уменьшают до 1-2 таб./сут.

Побочное действие:

Возможно набухание слизистой оболочки полости носа, повышенное потоотделение, астения, кардиалгия, брадикардия, депрессия, снижение либидо.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности (III триместр), в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

С осторожностью назначают совместно с хинидином, гуанетидином, сердечными гликозидами, бета-адреноблокаторами (риск усиления выраженности отрицательного хроно- и дромотропного действия).

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно одновременное или последовательное применение с другими гипотензивными средствами (ганглиоблокаторами, гидрохлоротиазидом, гидралазином).

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Raunatin