

## Раведерм



### Код АТХ:

- [D03](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Свинца ацетат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Мазь для наружного применения** светло-желтого цвета со слабым запахом пчелиного воска.

	<b>100 г</b>
свинца ацетат	0.1 г

*Вспомогательные вещества:* масло оливковое 80 г, воск пчелиный желтый 19.68 г, нипагин 0.2 г, нипазол 0.02 г.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
30 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.  
40 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Раведерм - это средство для местного лечения ожоговых ран. Обладает ранозаживляющим, противоожоговым, умеренным обезболивающим, антибактериальным и противогрибковым действием. Применение мази Раведерм предупреждает формирование коагуляционного некроза. Постепенное отторжение некротизированных тканей происходит на фоне умеренного воспаления, не выходящего за пределы зоны ожога. Смена повязки происходит безболезненно, без разрушения островков эпителия и грануляционной ткани.

Предотвращает образование послеожоговых кеппидных рубцов и дерматогейных контрактур. Наилучшие результаты достигаются при использовании мази в первые сутки от момента получения ожога.

#### Фармакокинетика

Свинец при применении мази Раведерм в рекомендуемой дозировке не накапливается в организме в опасных количествах. Процент резорбции свинца не превышает 0,5-1 %.

### **Показания к применению:**

- комплексное лечение ожогов II, III а степеней, в том числе кистей и области суставов (предотвращение дерматогенных контрактур);
- на этапе подготовки ожоговой раны к кожной пластике;
- после выполнения некрэктомии.

### **Относится к болезням:**

- [Дерматит](#)
- [Раны](#)

### **Противопоказания:**

- индивидуальная непереносимость компонентов мази, острые и хронические интоксикации свинцом;
- детский возраст;
- не рекомендуется применять при ожоге III б степени и площади более 10 % поверхности тела.

### **Способ применения и дозы:**

Наружно.

Мазь наносится на стерильную салфетку слоем около 2 мм и прикладывается к пораженному участку. Слой мази должен превосходить по окружности размеры раны не менее чем на 5 мм. Смена повязки осуществляется один раз в сутки или по мере пропитывания повязки раневым содержимым.

Сугочная доза препарата Раведерм зависит от размера поверхности ожога, но не более 10г.

Курс лечения - до полного заживления раневой поверхности, но не более 30 дней.

### **Побочное действие:**

Иногда может отмечаться жжение и зуд в месте нанесения, проходящие самостоятельно через несколько часов. Аллергические реакции.

### **Передозировка:**

О случаях передозировки препарата Раведерм не сообщалось.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не применять при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан детям.

## **Условия хранения:**

Хранить при температуре от 12 до 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ravederm>