Реаферон-Ес-Липинт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь в виде порошка или пористой массы от белого до белого с желтоватым оттенком цвета; допускается отслаивание, полное или частичное, от поверхности стекла флакона с образованием таблетоподобной структуры.

	1 фл.
интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	250 тыс.МЕ
- " -	500 тыс.МЕ
- " -	1 млн.МЕ

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, лецитин или липоид С100, холестерин, токоферол (витамин Е), лактоза.

Флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.
Флаконы стеклянные (3) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
Флаконы стеклянные (3) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
Флаконы стеклянные (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
Флаконы стеклянные (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусный и иммуномодулирующий препарат, представляет собой интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный, заключенный в липосомы и лиофильно высушенный.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— острый гепатит В;

— хронический гепатит В в активной и неактивной репликативных формах, а также хронический гепатит В, осложненным гломерулонефритом;

— атопические заболевания, аллергический риноконъюнктивит, бронхиальная астма при проведении специфической иммунотерапии;

— урогенитальная хламидийная инфекция у взрослых.

Профилактика и лечение гриппа и ОРЗ у взрослых и детей.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Астма
- Бронхиальная астма
- Бронхит
- Гепатит
- Гепатоз
- Грипп
- Инфекции

Противопоказания:

— тяжелые аллергические заболевания;

— беременность.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для приема внутрь. Непосредственно перед применением к содержимому флакона добавляют 1-2 мл дистиллированной или охлажденной кипяченой воды. При встряхивании в течение от 1 до 5 мин должна образоваться однородная суспензия.

При *остром гепатите В* препарат принимают за 30 мин до еды по следующей схеме: **взрослым и детям школьного возраста** назначают по 1 млн.МЕ 2 раза/сут в течение 10 дней; **детям дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)** - по 500 тыс.МЕ 1 раз/сут в течение 10 дней или после контрольных биохимических исследований крови в течение более длительного времени (до полного клинического выздоровления).

При *хроническом гепатите В в активной и неактивной репликативных формах,* а также при *хроническом гепатите В, ассоциированном с гломерулонефритом,* препарат принимают за 30 мин до еды по следующей схеме: **взрослым и детям школьного возраста** назначают по 1 млн.МЕ 2 раза/сут в течение 10 дней и затем переходят на введение 1 раз на ночь через день в течение 1 мес; **детям дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)** - по 500 тыс.МЕ 2 раза/сут в течение 10 дней и затем переходят на введение 500 тыс.МЕ 1 раз на ночь через день в течение 1 мес.

При *проведении специфической иммунотерапии* препарат принимают в утренние часы, через 30 мин после еды, по следующей схеме: при аллергическом риноконъюнктивите **взрослым** назначают по 500 тыс.МЕ ежедневно в течение 10 дней (курсовая доза - 5 млн.МЕ); при атопической бронхиальной астме **взрослым** - по 500 тыс.МЕ 1 раз/сут в течение 10 дней, а затем по 500 тыс.МЕ через день в течение 20 дней. Общая продолжительность лечения 30 - дней.

Для *профилактики гриппа и ОРЗ* препарат принимают за 30 мин до еды; **взрослым и детям старше 15 лет** назначают по 500 тыс.МЕ 2 раза в неделю в течение 1 месяца во время подъема заболеваемости; **детям от 3 до 15 лет** - по 250 тыс.МЕ 2 раза в неделю в течение 1 месяца во время подъема заболеваемости. При *терапии гриппа и ОРЗ* **взрослым и детям старше 15 лет** - по 500 тыс.МЕ 2 раз/сут в течение 3 дней; **детям от 3 до 15 лет** - по 250 тыс.МЕ 2 раза/сут в течение 3 дней.

При *комплексной терапии урогенитальных инфекций* **взрослым** назначают по 500 тыс.МЕ 2 раза/сут в течение 10 дней.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах препарат не оказывает побочного действия. Однако учитывая, что его активным действующим веществом является рекомбинантный интерферон, вызывающий при парентеральном введении гриппоподобные побочные явления, необходима осторожность при назначении препарата лицам с индивидуальной непереносимостью препаратов интерферона.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Интерферон альфа-2b способен снижать активность изоферментов цитохрома P_{450} и, следовательно, при одновременном применении влиять на метаболизм циметидина, фенитоина, дипиридамола, теофиллина, диазепама, пропранолола, варфарина, некоторых цитостатиков.

Препарат может усиливать нейротоксическое, миелотоксическое или кардиотоксическое действие лекарственных средств, назначавшихся ранее или одновременно с ним.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать совместного назначения с препаратами, угнетающими ЦНС, иммуносупрессивными лекарственными средствами (включая ГКС для системного применения).

Во время применения препарата употребление алкоголя не рекомендуется.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 8°C. Транспортировать при температуре не выше 8°C. Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Reaferon-Es-Lipint