

[Реактин](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Спрей назальный дозированный	1 доза
левокабастин	50 мкг

100 доз - флаконы полиэтиленовые с распылителем (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Левакабастин – селективный блокатор H_1 -гистаминовых рецепторов с продолжительным действием. Местный эффект наступает через 5 минут, а действие продолжается в течение до 12 ч. После интраназального введения Реактин устраняет симптомы аллергического ринита: выделения из носа, чихание, зуд в носовой полости.

Фармакокинетика

При каждом интраназальном введении из расчета 50 мкг/доза абсорбируется примерно 30-40 мкг левокабастина, C_{max} левокабастина в плазме крови достигается примерно через 3 ч после назального введения, экскретируется в неизменном виде почками с мочой.

Левакабастин связывается с белками плазмы крови приблизительно на 55%.

Основной метаболит левокабастина, ацилглюкуронид, образуется при глюкуронизации, которая является основным путем образования метаболита.

Период полувыведения левокабастина составляет около 35-40 ч.

Показания к применению:

— симптоматическая терапия сезонных и круглогодичных аллергических ринитов.

Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

— пациентам с нарушением функции почек и пожилым людям.

Способ применения и дозы:

Интраназально взрослым и детям старше 6 лет по 2 дозы (100 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в день. Применение препарата следует продолжать до устранения симптомов.

В случае выраженности симптомов можно применять 3-4 раза в сут.

Пациентов следует предупредить о необходимости освободить носовые ходы перед использованием спрея и сделать вдох через нос во время введения.

Перед первым применением снять защитный колпачок и несколько раз нажать на распылительную насадку до появления облачка «тумана». Флакон готов к дальнейшему использованию.

Перед каждым применением встряхивать флакон. Препарат вдыхать через нос.

Побочное действие:

Нежелательные явления, которые отмечались у $\geq 1\%$ пациентов в ходе клинических исследований:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота.

Со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, головокружение.

Со стороны дыхательной системы: боль в глотке и гортани, носовое кровотечение, кашель.

Прочие: усталость, боль в месте введения.

Нежелательные явления, которые отмечались у $< 1\%$ пациентов в ходе клинических исследований:

Со стороны дыхательной системы: кратковременное местное раздражение в месте введения.

Прочие: раздражение, боль, сухость, жжение и дискомфорт в месте введения.

Постмаркетинговые данные:

Очень часто ($> 1/10$), часто ($> 1/100$) и нечасто ($> 1/1000$, $< 1/100$), редко ($> 1/10000$, $< 1/1000$) и очень редко ($< 1/10000$, включая отдельные случаи).

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия (редко).

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (нечасто).

Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм (частота неизвестна), одышка (нечасто), отек слизистой оболочки носа (редко).

Прочие: недомогание (нечасто), отек век (частота неизвестна).

Передозировка:

Симптомы: сообщений по поводу передозировки левокабастина не поступало. При случайном приеме внутрь возможно снижение АД, тахикардия, небольшая седация.

Лечение: в случае приема внутрь пациенту следует выпить большое количество жидкости, чтобы ускорить выделение левокабастина через почки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Достоверные данные по применению назального спрея Реактин у беременных женщин отсутствуют. Поэтому, назальный спрей Реактин не должен применяться во время беременности за исключением тех случаев, когда предполагаемая польза для матери оправдывает потенциальный риск для плода.

Основываясь на определении концентрации левокабастина в слюне и грудном молоке кормящих женщин, которые однократно перорально получали 0.5 мг левокабастина, ожидается, что примерно 0.6% общей интраназальной дозы левокабастина может передаваться ребенку во время грудного вскармливания. Вследствие ограниченного числа клинических и экспериментальных данных, рекомендовано соблюдать осторожность при применении назального спрея Реактин кормящим женщинам. При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействия с алкоголем в клинических исследованиях не отмечалось. Также не было отмечено усиления действия алкоголя или диазепама при использовании обычных дозировок Реактина.

Одновременное применение ингибиторов изоферментов CYP3A4 кетоконазола или эритромицина не влияло на фармакокинетику левокабастина при назальном введении.

Возможные местные взаимодействия с другими назальными препаратами изучены недостаточно, за исключением взаимодействия с оксиметазолином, который может транзитивно снижать абсорбцию левокабастина при назальном введении.

Особые указания и меры предосторожности:

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности – не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

Влияние на способность управления автомобилем и пользования техникой

Назальный спрей Реактин в рекомендованной дозе обычно не оказывает клинически выраженного седативного эффекта и не снижает быстроту реакции по сравнению с плацебо. В случае возникновения сонливости не следует заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Запрещено использование препарата пациентам с нарушениями функции почек.

Применение в пожилом возрасте

Противопоказан в пожилом возрасте.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Reaktin>