# РЕАМБЕРИН

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Меглюмина натрия сукцинат

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Раствор для инфузий 1.5%*** прозрачный, бесцветный.

| | **1 л** |
|---|---|
| меглюмина натрия сукцинат | 15 г |

*Вспомогательные вещества:* натрия хлорид - 6 г, калия хлорид - 0.3 г, магния хлорид - 0.12 г, натрия гидроксид - 1.788 г, вода д/и - до 1 л.

200 мл - бутылки (1) - пачки картонные.
400 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

***Раствор для инфузий 1.5%*** прозрачный, бесцветный.

| | **1 л** |
|---|---|
| меглюмина натрия сукцинат | 15 г |

*Вспомогательные вещества:* натрия хлорид - 6 г, калия хлорид - 0.3 г, магния хлорид - 0.12 г, натрия гидроксид - 1.788 г, вода д/и - до 1 л.

250 мл - контейнеры полимерные (20) - пачки картонные (для стационаров).
500 мл - контейнеры полимерные (32) - пачки картонные (для стационаров).

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат с дезинтоксикационным действием для парентерального применения. Обладает антигипоксическим и

антиоксидантным действием, оказывая положительный эффект на аэробные процессы в клетке, уменьшая продукцию свободных радикалов и восстанавливая энергетический потенциал клеток.

Препарат активизирует ферментативные процессы цикла Кребса и способствует утилизации жирных кислот и глюкозы клетками, нормализует кислотно-щелочной баланс и газовый состав крови. Обладает умеренным диуретическим действием.

***Фармакокинетика***

При в/в введении препарат быстро утилизуется и не накапливается в организме.

## Показания к применению:

— в качестве антигипоксического и дезинтоксикационного средства при острых эндогенных и экзогенных интоксикациях различной этиологии у взрослых и детей старше 1 года.

## Относится к болезням:

- Интоксикация

## Противопоказания:

— состояние после черепно-мозговой травмы, сопровождающееся отеком головного мозга;

— выраженные нарушения функции почек;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* препарат следует применять при алкалозе.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** Реамберин вводят в/в капельно со скоростью не более 90 кап./мин (1-4.5 мл/мин) в обьеме 400-800 мл/сут.

Скорость введения препарата и дозировку определяют в соответствии со степенью тяжести заболевания больного.

**Детям в возрасте старше 1 года** Реамберин вводят в/в капельно из расчета 6-10 мл/кг массы тела 1 раз/сут со скоростью 3-4 мл/мин. Суточная доза препарата не должна превышать 400 мл.

Продолжительность курса введения препарата не должна превышать 11 дней.

## Побочное действие:

*Возможно:* при быстром введении препарата кратковременное чувство жара, покраснения верхней части тела.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Реамберин не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат можно применять в сочетании с антибиотиками, водорастворимыми витаминами и раствором глюкозы.

## Особые указания и меры предосторожности:

На фоне применения Реамберина возможно появление щелочной реакции крови и мочи (из-за активации аэробных процессов в организме).

***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

***Применение в детском возрасте***

**Детям в возрасте старше 1 года** Реамберин вводят в/в капельно из расчета 6-10 мл/кг массы тела 1 раз/сут со скоростью 3-4 мл/мин. Суточная доза препарата не должна превышать 400 мл.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 0° до 25°С; допускается замораживание.

При изменении цвета раствора или наличии осадка применение препарата недопустимо.

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Reamberin