

РЕАМБЕРИН



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Меглюмина натрия сукцинат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для инфузий 1.5% прозрачный, бесцветный.

	1 л
меглюмина натрия сукцинат	15 г

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 6 г, калия хлорид - 0.3 г, магния хлорид - 0.12 г, натрия гидроксид - 1.788 г, вода д/и - до 1 л.

200 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

400 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

Раствор для инфузий 1.5% прозрачный, бесцветный.

	1 л
меглюмина натрия сукцинат	15 г

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 6 г, калия хлорид - 0.3 г, магния хлорид - 0.12 г, натрия гидроксид - 1.788 г, вода д/и - до 1 л.

250 мл - контейнеры полимерные (20) - пачки картонные (для стационаров).

500 мл - контейнеры полимерные (32) - пачки картонные (для стационаров).

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с дезинтоксикационным действием для парентерального применения. Обладает антигипоксическим и

антиоксидантным действием, оказывая положительный эффект на аэробные процессы в клетке, уменьшая продукцию свободных радикалов и восстанавливая энергетический потенциал клеток.

Препарат активизирует ферментативные процессы цикла Кребса и способствует утилизации жирных кислот и глюкозы клетками, нормализует кислотно-щелочной баланс и газовый состав крови. Обладает умеренным диуретическим действием.

Фармакокинетика

При в/в введении препарат быстро утилизируется и не накапливается в организме.

Показания к применению:

— в качестве антигипоксического и дезинтоксикационного средства при острых эндогенных и экзогенных интоксикациях различной этиологии у взрослых и детей старше 1 года.

Относится к болезням:

- [Интоксикация](#)

Противопоказания:

- состояние после черепно-мозговой травмы, сопровождающееся отеком головного мозга;
- выраженные нарушения функции почек;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* препарат следует применять при алкалозе.

Способ применения и дозы:

Взрослым Реамберин вводят в/в капельно со скоростью не более 90 кап./мин (1-4.5 мл/мин) в объеме 400-800 мл/сут.

Скорость введения препарата и дозировку определяют в соответствии со степенью тяжести заболевания больного.

Детям в возрасте старше 1 года Реамберин вводят в/в капельно из расчета 6-10 мл/кг массы тела 1 раз/сут со скоростью 3-4 мл/мин. Суточная доза препарата не должна превышать 400 мл.

Продолжительность курса введения препарата не должна превышать 11 дней.

Побочное действие:

Возможно: при быстром введении препарата кратковременное чувство жара, покраснения верхней части тела.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Реамберин не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат можно применять в сочетании с антибиотиками, водорастворимыми витаминами и раствором глюкозы.

Особые указания и меры предосторожности:

На фоне применения Реамберина возможно появление щелочной реакции крови и мочи (из-за активации аэробных процессов в организме).

При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте старше 1 года Реамберин вводят в/в капельно из расчета 6-10 мл/кг массы тела 1 раз/сут со скоростью 3-4 мл/мин. Суточная доза препарата не должна превышать 400 мл.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 0° до 25°C; допускается замораживание.

При изменении цвета раствора или наличии осадка применение препарата недопустимо.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Reamberin>