Редецил

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Диоксометилтетрагидропиримидин
- Ретинол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн] Википедия[мнн мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Дерматопротекторное средство. Стимулирует регенерацию кожи, усиливает деление эпителиальных клеток кожи, тормозит процессы кератинизации, препятствует развитию гиперкератоза. Местное действие обусловлено наличием на поверхности клеток эпителия специфических ретинол-связывающих рецепторов.

Фармакокинетика

После нанесения легко проникает в кожу. C_{max} действующих веществ в крови достигается через 3-4 ч после нанесения и сохраняется на протяжении 12 ч. $T_{1/2}$ - 5.5 ч.

Показания к применению:

Ихтиоз, гиперкератоз, себорейный дерматит, псориаз, пиодермия, атопический дерматит, нейродермит, экзема, отморожения, ожоги, эрозии, язвы, трещины, атрофия кожи после длительного применения ГКС.

Относится к болезням:

- Дерматит
- Кератит
- Нейродермит
- Ожоги
- Псориаз
- Себорея
- Экзема

Противопоказания:

Гипервитаминоз А, I триместр беременности, острые воспалительные заболевания кожи, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Мазь следует наносить на пораженные участки кожи тонким слоем 2 раза/сут (утром и вечером). Длительность применения - 4-12 нед.

Побочное действие:

Местные реакции: усиление зуда, гиперемия.

Возможно: аллергические реакции.

Появление указанных побочных эффектов требует отмены препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

В периоде лактации (грудного вскармливания) не рекомендуется наносить на кожу молочных желез.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять в сочетании с другими препаратами, содержащими витамин А и ретиноиды, во избежание гипервитаминоза А.

Не совместим с антибиотиками тетрациклинового ряда.

Источник: http://drugs.thead.ru/Redecil