

Регидрон



Код АТХ:

- [A07CA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декстроза](#)
- [Калия хлорид](#)
- [Натрия хлорид](#)
- [Натрия цитрат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#) [англ](#)

Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления раствора для приема внутрь** белого цвета, кристаллический, растворим в воде; приготовленный раствор прозрачный, бесцветный, без запаха, с солоновато-сладковатым вкусом.

	1 пак.	1 л готового р-ра
натрия хлорид	3.5 г	59.9 ммоль
натрия цитрат	2.9 г	11.2 ммоль
калия хлорид	2.5 г	33.5 ммоль
декстроза	10 г	55.5 ммоль

Пакетики из алюминиевой фольги ламинированные (4) - пачки картонные.
Пакетики из алюминиевой фольги ламинированные (20) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для коррекции энергетического и электролитного баланса.

Восстанавливает водно-электролитное равновесие, нарушенное при обезвоживании организма; корректирует ацидоз.

Осмоляльность раствора Регидрона составляет 260 мосм/л, pH - 8.2.

По сравнению со стандартными растворами для пероральной регидратации, рекомендованными ВОЗ, осмоляльность Регидрона несколько ниже (эффективность растворов для регидратации со сниженной осмоляльностью хорошо доказана), концентрация натрия также ниже (для предотвращения развития гипернатриемии), а содержание калия выше (для более быстрого восстановления уровня калия).

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Регидрон отсутствуют.

Показания к применению:

— восстановление водно-электролитного равновесия, коррекция ацидоза при острой диарее (включая холеру), при тепловых поражениях, связанных с нарушениями водно-электролитного обмена; с целью профилактики - тепловые и физические нагрузки, приводящие к интенсивному потоотделению;

— регидратационная пероральная терапия при острой диарее с легкой (потеря веса составляет 3-5%) или средней (потеря веса - 6-10%) степенью дегидратации.

Относится к болезням:

- [Диарея](#)

Противопоказания:

- нарушения функции почек;
- инсулинзависимый сахарный диабет;
- инсулиннезависимый сахарный диабет;
- бессознательное состояние;
- кишечная непроходимость;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Один пакетик растворяют в 1 л воды, приготовленный раствор принимают внутрь. Если нет уверенности, что вода пригодна для питья, ее надо вскипятить и охладить перед приготовлением раствора. Приготовленный раствор следует хранить в прохладном месте при температуре от 2° до 8°С и использовать в течение 24 ч. В раствор нельзя добавлять какие-либо другие компоненты, чтобы не нарушить действие препарата.

Перед началом лечения пациента следует взвесить, чтобы оценить потерю веса и степень дегидратации.

Питание пациента или грудное вскармливание не следует прерывать во время проведения пероральной регидратационной терапии или следует продолжать сразу же после проведения регидратации. Рекомендуется избегать пищи, богатой жирами и простыми углеводами.

Для *предотвращения дегидратации* прием Регидрона следует начинать как только началась диарея. Обычно препарат применяют не более 3-4 дней, лечение прекращается с окончанием диареи.

При тошноте или рвоте раствор желательно давать в охлажденном виде небольшими повторяющимися дозами. Можно также использовать назогастральный зонд под наблюдением врача.

Для *регидратации* Регидрон принимают в течение первых 6-10 ч в количестве, которое вдвое превышает потерю массы тела, вызванную диареей. Например, если потеря массы тела составляет 400 г, количество Регидрона

Регидрон

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

составляет 800 г или 8.0 дл. В течение этой фазы лечения применение других жидкостей не требуется.

В случае *продолжения диареи* после коррекции дегидратации рекомендуется ввести Регидрон, воду и другие жидкости в течение 24 ч по следующей схеме:

Масса тела (кг)	Общее количество требуемой жидкости (дл)	Регидрон (дл)	Вода (дл)	Другие жидкости (дл)
5	8.3	3.5	2.1	2.7
6	10.0	4.2	2.5	3.3
7	10.5	4.4	2.6	3.5
8	11.0	4.6	2.8	3.6
9	11.5	4.8	2.9	3.8
10	12.0	5.0	3.0	4.0
12	13.0	5.4	3.2	4.4
14	14.0	5.8	3.5	4.7
16	15.0	6.2	3.7	5.1
18	16.0	6.6	4.0	5.4
20	17.0	7.0	4.2	5.8
25	18.0	7.5	4.5	6.0
30	19.0	8.0	4.8	6.2
40	21.0	9.0	5.4	6.6
50	23.0	10.0	6.0	7.0
70	27.0	12.0	7.2	7.8

Побочное действие:

При соблюдении рекомендованных доз Регидрона побочные эффекты маловероятны. Потенциально возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: при введении раствора Регидрона в большом объеме или чрезмерной концентрации возможна гипернатриемия (слабость, нервномышечное возбуждение, сонливость, спутанность сознания, кома, иногда даже остановка дыхания); у пациентов с нарушением функции почек возможно развитие метаболического алкалоза, что проявляется в снижении вентиляции легких, нервномышечном возбуждении и тетанических судорогах.

Лечение: в случае значительной передозировки требуется контроль врача. Коррекцию баланса электролитов и жидкости следует проводить на основании данных лабораторных исследований.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В рекомендуемых дозах Регидрон можно назначать при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Регидрон не изучено.

Раствор препарата имеет слабощелочную реакцию, поэтому может влиять на эффективность лекарственных препаратов, всасывание которых зависит от pH содержимого кишечника.

Диарея сама по себе может изменять всасывание многих лекарственных препаратов, которые абсорбируются в тонкой или толстой кишке, или препаратов, в метаболизме которых имеет место внутриспеченочная циркуляция.

Особые указания и меры предосторожности:

Тяжелую дегидратацию (потеря массы тела >10%, анурия) следует корректировать с применением средств для

Регидрон

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

регидратации для в/в введения, после этого можно назначать Регидрон.

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата, если необходимость в дополнительном введении электролитов не подтверждена лабораторными исследованиями.

Пакетик препарата Регидрон растворяются в 1 л воды. Если в рекомендуемом объеме дается слишком концентрированный раствор, у пациента может развиваться гипернатриемия.

В раствор нельзя добавлять сахар. Пищу можно давать сразу после регидратации. При рвоте следует подождать 10 мин и дать выпить раствор медленно, небольшими глотками. Пациентам, у которых дегидратация развилась на фоне почечной недостаточности, сахарного диабета или других хронических заболеваний, при которых нарушаются кислотно-щелочной, электролитный или углеводный баланс, требуется тщательный мониторинг при проведении терапии препаратом Регидрон.

При применении препарата Регидрон требуется консультация врача в следующих случаях: замедление речи, быстрое утомление, сонливость, пациент не отвечает на вопросы, повышение температуры тела более 39°C, прекращение выделение мочи, появление жидкого кровавистого стула, диарея продолжительностью более 5 дней, внезапное прекращение диареи и появление сильных болей, если лечение на дому неэффективно и невозможно.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Регидрон не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан при нарушениях функции почек.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при комнатной температуре (от 15° до 25°C) в недоступном для детей месте. Срок годности – 3 года.

Приготовленный раствор следует хранить в холодильнике (при температуре от 2° до 8°C) не более 24 ч.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Regidron>