

Регулак



Код АТХ:

- [A06AB06](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Сеннозиды А и В](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

∨ Кубики для разжевывания	1 шт.
листья сенны остролистной	710 мг
плоды сенны остролистной	300 мг

1 шт. - пакетики из алюминиевой фольги (6) - пачки картонные.

1 шт. - пакетики из алюминиевой фольги (12) - пачки картонные.

1 шт. - пакетики из алюминиевой фольги (18) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — слабительное.

Фармакодинамика

Действие наступает через 8 ч после приема. Слабительный эффект обусловлен воздействием на рецепторы толстого кишечника, усиливающим перистальтику, что приводит к более быстрому опорожнению кишечника.

Противопоказания:

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

кишечная непроходимость;

боли в животе неясного происхождения;

ущемленная грыжа;

острые воспалительные заболевания брюшной полости (в т.ч. болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит, перитонит);

метроррагия;

желудочно-кишечные кровотечения;

тяжелые формы дегидратации с потерей воды и солей;

детский возраст до 12 лет.

С осторожностью:

беременность;

период грудного вскармливания;

печеночная и/или почечная недостаточность;

состояния после полостных операций.

Способ применения и дозы:

Внутрь, тщательно разжевав, по возможности вечером, перед сном. Взрослым — по 1 кубику, детям старше 12 лет — по 1/4–1/2 кубика в сутки. Доза может быть изменена только по назначению врача. Длительность применения — не более 2 нед.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны жалобы на спазмы ЖКТ (необходимо уменьшить дозу препарата Регулак®). Крайне редко — метеоризм, тошнота, рвота, аллергические реакции.

При длительном применении — потеря электролитов, в частности калия; появление белка и крови в моче (альбуминурия и гематурия); отложение пигмента на слизистой оболочке кишечника (псевдомеланоз кишечника), которое неопасно и, как правило, исчезает при прекращении приема препарата.

Потеря калия может привести к нарушениям функции сердечной мышцы, особенно при одновременном приеме сердечных гликозидов, мочегонных средств и ГКС.

Длительное применение препарата может привести к развитию атонии кишечника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с тиазидными диуретиками, ГКС, препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии. Нарушает абсорбцию тетрациклинов.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациенты, страдающие наследственной непереносимостью фруктозы или нарушением всасывания глюкозы и галактозы, не должны принимать препарат Регулак®.

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что энергетическая ценность 1 кубика — примерно 63 кДж, равная 15,4 ккал или 0,31 ХЕ.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Regulaks>