Рексод-Оф

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления глазных капель в виде порошка или пористой массы белого с зеленоватым оттенком цвета.

	1 фл.
супероксиддисмутаза человека рекомбинантная	800 000 ЕД

Растворитель: вода д/и.

Флаконы (1) в компл. с растворителем (амп. 2 мл) и пипеткой - упаковки ячейковые контурные (1) кассетные - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антиоксидантный препарат. Супероксиддисмутаза является эндогенным акцептором свободных кислородных радикалов, избыточное накопление которых в клетке играет важную роль, в развитии кислород-зависимых патологических процессов (гипоксия, воспаление, интоксикация). Супероксиддисмутаза катализирует реакцию дисмутации супероксидных радикалов и предотвращает образование других, более опасных для организма радикалов: гидроксильного радикала и синглетного кислорода.

Рексод-ОФ нормализует протекающие с участием свободных радикалов кислорода окислительные процессы, в т.ч. метаболические процессы в нервных волокнах. Предупреждает окислительную модификацию белков, приостанавливает процессы атрофии зрительного нерва, а также связанное с активацией перекисного окисления липидов разрушение мембран клеток.

Фармакокинетика

Через 1 ч после введения, терапевтические концентрации препарата присутствуют в роговице и конъюнктиве, а также в сетчатке и зрительном нерве.

Показания к применению:

— первичная открытоугольная глаукома;

— аденовирусное поражение глаз;

— вторичная кератопатия.

Относится к болезням:

- Глаукома
- Кератит

Противопоказания:

— возраст до 18 лет;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание).

Способ применения и дозы:

Рексод-ОФ закапывают в конъюнктивальный мешок. Для приготовления глазных капель содержимое флакона 0.8 млн. ЕД растворяют в 2 мл воды для инъекций. Полученный раствор (глазные капли) хранят в холодильнике при температуре от 4° до 10°С не более 3 дней.

При *первичной открытоугольной глаукоме* в глаз закапывают по 2 капли через каждые 5 мин в течение 30 мин 2 раза/сут (утром и вечером). Курс лечения - не менее 10 дней. Курс лечения можно повторить через 1-3 мес. Повторение курса лечения необходимо при развитой и далеко зашедшей стадиях заболевания.

При *вторичных кератопатиях*: по 2 капли 5-8 раз/сут; курс - 3-7 дней.

При *аденовирусных поражениях глаз:* по 2 капли 6-8 раз/сут с интервалом 1-2 ч; курс лечения - не менее 10 дней.

Местное применение других офтальмологических препаратов возможно не ранее чем через 10 мин после закапывания препарата Рексод-ОФ.

Побочное действие:

Местные реакции: возможно чувство сухости глаз, покраснение, ощущение инородного тела, которое проходит по окончании курса лечения; в отдельных случаях - аллергические реакции.

Передозировка:

Препарат не токсичен. Случаи передозировки не известны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Изучение препарата Рексод-ОФ у пациентов, носящих контактные линзы, не проводилось, поэтому на время лечения рекомендуется отказаться от ношения контактных линз.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 4° до 10°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Reksod-Of