

## [РектАктив \(свечи\)](#)



### Код АТХ:

- [A06AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Каштана конского семян экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### *Форма выпуска, описание и состав*

<b>↕ Суппозитории ректальные</b>	<b>1 супп.</b>
сухой экстракт плодов каштана конского	50 мг
содержание суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин	20%

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

<b>↕ Суппозитории ректальные</b>	<b>1 супп.</b>
сухой экстракт плодов каштана конского	100 мг
содержание суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин	20%

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Показания к применению:

— функциональные запоры различной этиологии: привычные, психогенные, старческие, запоры у малоподвижных больных, а также запоры, связанные с понижением чувствительности рецепторного аппарата прямой кишки и нарушении биоритма дефекации).

### Относится к болезням:

- [Запор](#)

## **Противопоказания:**

- кишечная непроходимость;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- острый геморрой;
- острый проктит и парапроктит;
- спастический запор;
- опухоли прямой кишки;
- трещины прямой кишки;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

**Взрослым** препарат назначают по 1 супп. (50-100 мг) 1 раз/сут; максимальная разовая и суточная доза составляет 300 мг/сут. Длительность курса лечения не должна превышать 30 дней.

Препарат применяют ректально (вводят в прямую кишку) 1 раз/сут за 5-15 мин до запланированного акта дефекации.

Чтобы вынуть суппозиторий из ячейковой упаковки, следует отломить одну ячейку с суппозиторием по насечке и, разъединив края ленты, потянуть за них в разные стороны. Суппозиторий вводят глубоко в прямую кишку.

## **Побочное действие:**

*В отдельных случаях:* аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения в прямой кишке.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* раздражение слизистой оболочки прямой кишки, в отдельных случаях - боль в области прямой кишки.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 1 год 10 месяцев.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/RektAktiv\\_svechi](http://drugs.thead.ru/RektAktiv_svechi)