Ректактив

Код АТХ:

- A06AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Каштана конского семян экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные***	**1 супп.**
сухой экстракт плодов каштана конского	50 мг
содержание суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин	20%

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

◊ ***Суппозитории ректальные***	**1 супп.**
сухой экстракт плодов каштана конского	100 мг
содержание суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин	20%

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство растительного происхождения. Тритерпеновый сапонин эсцин, содержащийся в экстракте конского каштана, стимулирует интерорецепторы слизистой оболочки прямой кишки, вызывая усиление ее перистальтики и быструю эвакуацию каловых масс.

Эффект наступает через 5-15 мин после применения суппозитория. Позывы к опорожнению кишечника прекращаются после акта дефекации. Препарат не вызывает растяжения стенок прямой кишки, укрепляет и тонизирует ее гладкую мускулатуру. При курсовом применении препарат восстанавливает дефекационный рефлекс и нормализует биоритм дефекации.

Фармакокинетика

При ректальном введении препарат не успевает поступить в кровь и поэтому не оказывает влияния на метаболические процессы организма.

Показания к применению:

— функциональные запоры различной этиологии: привычные, психогенные, старческие, запоры у малоподвижных больных, а также запоры, связанные с понижением чувствительности рецепторного аппарата прямой кишки и нарушении биоритма дефекации).

Относится к болезням:

- Запор

Противопоказания:

— кишечная непроходимость;

— острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;

— острый геморрой;

— острый проктит и парапроктит;

— спастический запор;

— опухоли прямой кишки;

— трещины прямой кишки;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым препарат назначают по 1 супп. (50-100 мг) 1 раз/сут; максимальная разовая и суточная доза составляет 300 мг/сут. Длительность курса лечения не должна превышать 30 дней.

Препарат применяют ректально (вводят в прямую кишку) 1 раз/сут за 5-15 мин до запланированного акта дефекации.

Чтобы вынуть суппозиторий из ячейковой упаковки, следует отломить одну ячейку с суппозиторием по насечке и, разъединив края ленты, потянуть за них в разные стороны. Суппозиторий вводят глубоко в прямую кишку.

Побочное действие:

В отдельных случаях: аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения в прямой кишке.

Передозировка:

Симптомы: раздражение слизистой оболочки прямой кишки, в отдельных случаях - боль в области прямой кишки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 1 год 10 месяцев.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rektaktiv