

[Реладорм](#)



Код АТХ:

- [N05CB02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диазепам](#)
- [Циклобарбитал](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает седативное, снотворное, анксиолитическое, противосудорожное, центральное миорелаксирующее действие.

Циклобарбитал - снотворное средство из группы барбитуровой кислоты со средней продолжительностью действия, вызывает седативный эффект.

Диазепам - анксиолитическое средство (транквилизатор) бензодиазепинового ряда, усиливает эффекты ГАМК, уменьшает возбудимость нейронов, тормозит полисинаптические спинальные рефлексы, при этом не оказывает периферического миорелаксирующего эффекта. Анксиолитическое действие проявляется в уменьшении эмоционального напряжения, ослаблении тревоги, страха, беспокойства.

Показания к применению:

- бессонница;
- затруднение засыпания;
- кратковременный сон;
- раздражительность.

Относится к болезням:

- [Бессонница](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- печеночная недостаточность;
- миастения;
- суицидальная наклонность;
- гиперкапния;
- беременность;
- период лактации;
- порфирия;
- пожилой возраст;
- детский возраст (до 1 года).

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, с учетом реакции больного на препарат. В качестве снотворного лекарственного средства - по 1/2-1 таб. за 1 ч до сна; в качестве седативного - по 1/4-1/2 таб. 1-2 раза/сут.

Побочное действие:

Аллергические реакции, сонливость; при назначении в высоких дозах - утомляемость, тремор, миастения, атаксия, помрачение сознания.

При длительном применении - привыкание, лекарственная зависимость.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает седативное действие антипсихотических, седативных препаратов, средств для общей анестезии, антидепрессантов, наркотических анальгетиков.

Ингибиторы микросомального окисления удлиняют $T_{1/2}$ диазепама.

Нарушает метаболизм фенитоина.

Несовместим с этанолом, антикоагулянтами, ГКС, доксициклином, гризеофульвином, пероральными контрацептивами.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять в I триместре беременности, за исключением случаев крайней необходимости.

При назначении беременным женщинам возможно изменение ЧСС плода.

При регулярном приеме в период лактации рекомендуется прерывать кормление грудью.

Риск формирования лекарственной зависимости возрастает при использовании больших доз, значительной длительности лечения и у пациентов, ранее злоупотреблявших этанолом или седативными лекарственными средствами. В случае развития лекарственной зависимости резкая отмена сопровождается синдромом отмены (головная боль, миалгия, тревожность, напряженность, спутанность сознания, раздражительность; в тяжелых

Реладорм

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

случаях - дереализация, деперсонализация, гиперактузия, парестезии в конечностях, световая и тактильная гиперчувствительность; галлюцинации и эпилептические припадки).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, принимающим препарат, следует воздерживаться от занятий видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрых физических и психических реакций.

При нарушениях функции печени

Противопоказание — печеночная недостаточность.

Применение в пожилом возрасте

Противопоказание — пожилой возраст.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 1 года).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Reladorm>